

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

Önsöz.....	
İçindekiler.....	I
Acıpayam Sırçalık Beldesi Arazilerinin Değerlendirilmesi ve Kullanım Planlaması	II
Acıpayam Sırçalık Beldesi Tarım Arazilerinin Özellikleri.....	II
Acıpayam Sırçalık Beldesi Etüd Kapsamı Arazilerinin Haritası	III
Serilerin Değerlendirilmesi.....	1
1.Çamlıbahçe Serisi	1
1–1 Cb4.B1t2 Çamlıbahçe Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	1
1–2 Cb3.B1t2 Çamlıbahçe Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	2
1–3 Cb4.d1C1t2 Çamlıbahçe Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	3
2.Corum Serisi	4
2–1. Co3.d2C2t1(T) Corum Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	4
2–2. Co4.d1At2 Corum Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	5
2–3. Co4.d2B-C1t2 Corum Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	6
2–4. Co4.d2C1t2 Corum Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	7
3. İğdelik Serisi	8
3–1. Ig3.d1B1t1 İğdelik Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	8
4. Koçgöz Serisi	9
4–1. Kg4.d1C1t2 Koçgöz Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	9
4–2. Kg3.d1Bt2 Koçgöz Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	10
4–3. Kg2.d1D2t3 Koçgöz Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	11
4–4. Kg4.d1C1t3 Koçgöz Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	12
4–5. Kg4.d1B1t3 Koçgöz Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	13
4–6. Kg4.B1t2 Koçgöz Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	14
4–7. Kg3.d1B1t2 Koçgöz Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	15
4–8. Kg4.Bt1 Koçgöz Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	16
5. Kovanlık Serisi	17
5–1. Kn4.Bt2 Kovanlık Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	17
5–2. Kn3.d1C1t2 Kovanlık Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	18
6. Kurtlar Serisi	19
6–1. Kl3.d2C1t2 Kurtlar Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	19
6–2. Kl3.d2B1t3 Kurtlar Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	20
6–3. Kl3.d3C1t3 Kurtlar Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	21
6–4. Kl4.d1C1t3 Kurtlar Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	22
6–5. Kl2.d3D2t3 Kurtlar Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	23
6–6. Kl4.d1Bt2 Kurtlar Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	24
6–7. Kl2.d2D2t3 Kurtlar Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	25
6–8. Kl3.Bt2 Kurtlar Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	26
6–9. Kl3.Art2 Kurtlar Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	27
6–10. Kl3.d2B-C2t2 Kurtlar Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	28
6–11. Kl4.d1Bt3 Kurtlar Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	29
6–12. Kl4.Bt2 Kurtlar Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	30
7. Sırçalık Serisi	31
7–1 Sr3.Bt2 Sırçalık Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	31
7–2 Sr3.Art1 Sırçalık Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	32
7–3 Sr4.At1 Sırçalık Serisi Özellikleri ve Ürün Deseni Önerileri.....	33
Meyveler.....	34
Yumuşak Çekirdekler.....	34
Sert Çekirdekler.....	34
Sert Kabuklular.....	34
Bağ Anaç ve Çeşitleri.....	35
Meyvelerde Dikim Aralıkları.....	35
Serin İklim Tahilları.....	36
Baklagiller.....	36
Endüstri Bitkileri.....	36
Sebzeler.....	37
Yem Bitkileri.....	37
Meyve Kataloğu.....	38-57
Serilerin profil ve morfolojisi.....	58-64

ACİPAYAM SIRÇALIK KÖYÜ ARAZİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve KULLANIM PLANLAMASI


Acıpayam İlçesi Sırçalık Köyü tarım arazilerinin Detaylı Temel Toprak Etüt ve Potansiyel Arazi Kullanım Haritalarının hazırlanması projesi sonucu; 7 farklı toprak serisi “Çamlıbahçe, Corum, İğdelik, Koçgöz, Kovanlık, Kurtlar, Sırçalık” ve 33 adet farklı haritalama birimi tespit edilmiştir. (Denizli ili topraklarının detaylı temel toprak etüt ve potansiyel arazi kullanım haritalarının hazırlanması projesi II. kısım Acıpayam ovası kitabı cilt-1)

Sırçalık Köyünde İl ve İlçe Müdürlüğümüzün Teknik elemanlarının öncelikli potansiyel ana ürün deseninin oluşturulması dikkate alınarak sulu ve kuru şartlarda tek ve çok yıllık ürünler tavsiye edilmiştir.

Projede tavsiye edilen öneriler dışında iç ve dış pazarlardaki arz ve talep değişimi de dikkate alınarak geliştirilecek yeni anaç ve ürün çeşitlerinin ekim ve dikimi de ürün desenine dahil edilebilir.

ACİPAYAM SIRÇALIK KÖYÜ TARIM ARAZİLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Proje Etüt Alanı	: 1462 ha
Sırçalık Köyünün rakımı	: 1000 m
Yıllık ortalama sıcaklık	: 12,7 $^{\circ}$ C
Yıllık ortalama yüksek sıcaklık	: 20,0 $^{\circ}$ C
Yıllık ortalama düşük sıcaklık	: 5,6 $^{\circ}$ C
En düşük ortalama sıcaklık Ocak ayında	: -2,6 $^{\circ}$ C
En yüksek ortalama sıcaklık Ağustos ayında	: 32,3 $^{\circ}$ C
Açık Günler Sayısı	: 149,2 gün
Bulutlu Günler Sayısı	: 171,6 gün
Kapalı Günler Sayısı	: 44,2 gün
En fazla Aralık ayında olmak üzere yıllık ortalama yağış	: 520,8 mm
Kireç oranları %0,57 ile 31,76 ve pH 7,15 ile 8,01 arasında olup alkali topraklardır	
Asit karakterli Amonyum sülfat, Triple süper fosfat, Potasyum sülfat gibi gübreler tercih edilmeli, kükürt uygulaması yapılmalıdır	
Genel olarak organik maddece fakirdir, çiftlik gübresi ve yeşil gübreleme yapılmalıdır.	
Az, orta ve çok taşlılık mevcuttur.	
Arazilerin eğimi düz eğim ile dik eğim arasında değişim göstermektedir.	
Toprakların bünyesi genel olarak Tın ile Kil arasında değişmektedir.	
Topraklar sığ(30-50 cm) ve derin (90–120 cm) arasındadır.	
Yetiştiriciliği yapılacak olan ürün seçimi ve doğru bitki besleme için toprak, yaprak tahlillerinin yapılması gerekmektedir	



SERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- ÇAMLIBAHÇE SERİSİ

1-1 Cb4.B1t2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Çamlıbahçe serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 2. sınıf oldukça iyi tarım arazileri grubunda
2. Sulu tarıma az uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120cm)- Orta taşlı
5. Eğim: Hafif eğimli (% 2-6)
6. Tekstür: Kil
7. Tarla kapasitesi: % 51,74 -Solma noktası: %34,27-Yararlı su:% 17,47
8. pH: Hafif Alkalin (7,55-8,00)
9. Kireç: Kireçli (%0,72-5,01)
10. Organik madde: Fakir (%0,41-0,85)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (%0,03-0,07), Fosfor yetersiz (%2,65-8,29)
Potasyum orta (%0,40-0,90)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli (4,22-6,74 ppm), Çinko yetersiz (0,00-0,177 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Ceviz, Badem, Bağ, Kiraz

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Marul, Pırasa, Lahanagiller, Bamya, Fasulye, Börülce, İspanak, Maydanoz, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fiğ

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fig, Korunga, Mürdümük

1-2 Cb3.B1t2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Çamlıbahce serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 2. sınıf oldukça iyi tarım arazileri grubunda
2. Sulu tarıma az uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120cm)- Orta taşlı
5. Eğim: Hafif eğimli (% 2-6)
6. Tekstür: Kil
7. Tarla kapasitesi: % 51,74 -Solma noktası: %34,27-Yararlı su:% 17,47
8. pH: Hafif Alkalin (7,55-8,00)
9. Kireç: Kireçli (%0,72-5,01)
10. Organik madde: Fakir (%0,41-0,85)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (%0,03-0,07), Fosfor yetersiz (%2,65-8,29)
Potasyum orta (%0,40-0,90)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli (4,22-6,74 ppm), Çinko yetersiz (0,00-0,177 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Ceviz, Badem, Bağ, Kiraz

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Bamya, Fasulye, Börülce, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fig

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fig, Korunga, Mürdümük

1–3 Cb4.d1C1t2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Çamlıbahce serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 3. sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda
2. Sulu tarıma az uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120cm)- Orta taşlı
5. Eğim: Orta eğimli (% 6-12)
6. Tekstür: Kil
7. Tarla kapasitesi: % 51,74 -Solma noktası: %34,27-Yararlı su:% 17,47
8. pH: Hafif Alkalin (7,55-8,00)
9. Kireç: Kireçli (%0,72-5,01)
10. Organik madde: Fakir (%0,41-0,85)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (%0,03-0,07), Fosfor yetersiz (%2,65-8,29)
Potasyum orta (%0,40-0,90)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli (4,22-6,74 ppm), Çinko yetersiz (0,00-0,177 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Ceviz, Badem, Bağ, Kiraz

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Bamya, Fasulye, Börülce, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

2- CORUM SERİSİ

2-1. Co3.d2C2t1(T) Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde corum serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özelliklerini

1. 3. sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda
2. Sulu tarıma az uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Orta derin toprak yapısında (50-90cm)-Az taşlı
5. Eğim:Orta Eğimli (%6-12) -Tesviyeli
6. Tekstür: Killi, Tin
7. Tarla kapasitesi: % 40,22 -Solma noktası: % 27,65-Yararlı su:%12,57
8. pH: Hafif Alkalin (7,97-8,1)
9. Kireç: Orta Kireçli (%3,64-16,80)
10. Organik madde: Fakir (% 0,18-0,66)
11. Makro Elementler: Azot yetersiz (% 0,04-0,10), Fosfor yetersiz (% 1,01-3,33)
Potasyum orta (% 0,29-0,93)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli(3,34-3,75 ppm), Çinko yetersiz (0,062-0,178 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Ceviz, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Lahanagiller, Bamya, Fasulye, Börülce, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Hayvan Pancarı, Silajlık Mısır, Sudan otu, Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

2–2. Co4.d1At2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde corum serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özelliklerini

1. 2. sınıf oldukça iyi tarım arazileri grubunda
2. Sulu tarıma az uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında (90-120 cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Düz (%0-1)
6. Tekstür: Killi ,Tın
7. Tarla kapasitesi: % 40,22 -Solma noktası: % 27,65-Yararlı su:%12,57
8. pH: Hafif Alkalin (7,97-8,1)
9. Kireç: Orta Kireçli (%3,64-16,80)
10. Organik madde: Fakir (% 0,18-0,66)
11. Makro Elementler: Azot yetersiz (% 0,04-0,10), Fosfor yetersiz (% 1,01-3,33)
Potasyum orta (% 0,29-0,93)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli(3,34-3,75 ppm), Çinko yetersiz (0,062-0,178 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Erik, Şeftali, Vişne, Kayısı, Ceviz, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

2–3. Co4.d2B-C1t2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde corum serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikler

1. 3. sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda
2. Sulu tarıma az uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Orta derin toprak yapısında (50-90 cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Hafif eğimli, Orta eğimli (%2–12)
6. Tekstür: Killi, Tın
7. Tarla kapasitesi: % 40,22 -Solma noktası: % 27,65-Yararlı su:%12,57
8. pH: Hafif Alkalin (7,97-8,1)
9. Kireç: Orta Kireçli (%3,64-16,80)
10. Organik madde: Fakir (% 0,18-0,66)
11. Makro Elementler: Azot yetersiz (% 0,04-0,10), Fosfor yetersiz (% 1,01-3,33)
Potasyum orta (% 0,29-0,93)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli(3,34-3,75 ppm), Çinko yetersiz (0,062-0,178 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Erik, Vişne, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

2-4. Co4.d2C1t2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde corum serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özelliklerini

1. 3. sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda
2. Sulu tarıma az uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Orta derin toprak yapısında (50-90 cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Orta eğimli (%6-12)
6. Tekstür: Killi ,Tın
7. Tarla kapasitesi: % 40,22 -Solma noktası: % 27,65-Yararlı su:%12,57
8. pH: Hafif Alkalin (7,97-8,1)
9. Kireç: Orta Kireçli (%3,64-16,80)
10. Organik madde: Fakir (% 0,18-0,66)
11. Makro Elementler: Azot yetersiz (% 0,04-0,10), Fosfor yetersiz (% 1,01-3,33)
Potasyum orta (% 0,29-0,93)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli(3,34-3,75 ppm), Çinko yetersiz (0,062-0,178 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Erik, Vişne, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

3- İĞDELİK SERİSİ

3-1. Ig3.d1B1t1 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde İğdelik serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özelliklerini

1. 2. sınıf oldukça iyi tarım arazileri grubunda
2. Sulu tarıma orta uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) II. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120cm)-Az taşlı
5. Eğim: Hafif eğimli (%2-6)
6. Tekstür: Killi Tın.
7. Tarla kapasitesi: % 29,96 -Solma noktası: %18,08-Yararlı su:% 11,88
8. pH: Hafif Alkalin (7,87-7,93)
9. Kireç: Çok Fazla Kireçli (% 27,80-31,76)
10. Organik madde: Fakir (% 0,53-1,05)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (% 0,05-0,07), Fosfor orta (% 1,63-6,59)
Potasyum yeterli (% 0,35-0,92)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli(4,34-4,84 ppm), Çinko yetersiz (0,017-0,369 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ceviz, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Marul, Lahanagiller, Bamya, Fasulye, Börülce, Ispanak, Maydanoz, Kavun, Karpuz

Hububat:

Bağday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş, Tütün

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Yonca, Hayvan Pancarı, Silajlık Mısır, Sudan otu, Fığ

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Bağday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Mürdümük

4-KOÇGÖZ SERİSİ

4-1. Kg4.d1C1t2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Koçgöz serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özelliklerini

1. 3.sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda.
2. Sulu tarıma az uygun.
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120 cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Orta eğimli (%6-12)
6. Tekstür: Killi
7. Tarla kapasitesi: % 27,76 -Solma noktası: % 14,75-Yararlı su:% 13,01
8. pH: Hafif Alkalin (7,55–7,81)
9. Kireç: Az kireçli (%0,57-0,80)
10. Organik madde: Fakir (%0,10–0,89)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (%0,07–0,16), Fosfor yetersiz (%1,66–3,72)
Potasyum orta (%0,21–0,52)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli (5,30-6,93 ppm), Çinko yetersiz (0,094–0,128ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Erik, Vişne, Kayısı, Ceviz, Badem, Bağ, Ayva, Kiraz

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Marul, Kavun, Karpuz

Hububat:

Bağday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fığ

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Bağday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fığ, Korunga, Mürdümük

4-2. Kg3.d1Bt2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Koçgöz serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özelliklerini

1. 3.sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda.
2. Sulu tarıma az uygun.
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120 cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Hafif eğimli (%2-6)
6. Tekstür: Killi
7. Tarla kapasitesi: % 27,76 -Solma noktası: % 14,75-Yararlı su:% 13,01
8. pH: Hafif Alkalin (7,55–7,81)
9. Kireç: Az kireçli (%0,57-0,80)
10. Organik madde: Fakir (%0,10–0,89)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (%0,07–0,16), Fosfor yetersiz (% 1,66–3,72)
Potasyum orta (%0,21–0,52)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli (5,30-6,93 ppm), Çinko yetersiz (0,094–0,128ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Erik, Vişne, Kayısı, Ceviz, Badem, Bağ, Kiraz, Ayva

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Marul, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

4-3. Kg2.d1D2t3 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Koçgöz serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikler

1. 3.sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda.
2. Sulu tarımda özel bitkilere uygun.
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) IV. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120 cm)-Çok taşlı
5. Eğim: Dik eğimli (%12-20)
6. Tekstür: Killi
7. Tarla kapasitesi: % 27,76 -Solma noktası: % 14,75-Yararlı su:% 13,01
8. pH: Hafif Alkalin (7,55–7.81)
9. Kireç: Az kireçli (%0,57-0,80)
10. Organik madde: Fakir (%0,10–0,89)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (%0,07–0,16), Fosfor yetersiz (% 1,66–3,72)
Potasyum orta (%0,21–0,52)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli (5,30-6,93 ppm), Çinko yetersiz (0.094–0.128ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Kayısı, Ceviz, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

4-4. Kg4.d1C1t3 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Koçgöz serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 3.sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda.
2. Sulu tarıma az uygun.
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) IV. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120 cm)-Çok taşlı
5. Eğim: Orta eğimli (%6-12)
6. Tekstür: Killi
7. Tarla kapasitesi: % 27,76 -Solma noktası: % 14,75-Yararlı su:% 13,01
8. pH: Hafif Alkalin (7,55–7,81)
9. Kireç: Az kireçli (%0,57-0,80)
10. Organik madde: Fakir (%0,10–0,89)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (%0,07–0,16), Fosfor yetersiz (%1,66–3,72)
Potasyum orta (%0,21–0,52)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli (5,30-6,93 ppm), Çinko yetersiz (0,094–0,128ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Kayısı, Ceviz, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fığ

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fığ, Korunga, Mürdümük

4-5. Kg4.d1B1t3 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Koçgöz serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 3.sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda.
2. Sulu tarımda özel bitkilere uygun.
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120 cm)-Çok taşlı
5. Eğim: Hafif eğimli (%2-6)
6. Tekstür: Killi
7. Tarla kapasitesi: % 27,76 -Solma noktası: % 14,75-Yararlı su:% 13,01
8. pH: Hafif Alkalin (7,55–7.81)
9. Kireç: Az kireçli (%0,57-0,80)
10. Organik madde: Fakir (%0,10–0,89)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (%0,07–0,16), Fosfor yetersiz (% 1,66–3,72)
Potasyum orta (%0,21–0,52)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli (5,30-6,93 ppm), Çinko yetersiz (0.094–0.128ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Kayısı, Ceviz, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

4–6. Kg4.B1t2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Koçgöz serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 3.sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda.
2. Sulu tarıma orta uygun.
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120 cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Hafif eğimli (%2-6)
6. Tekstür: Killi
7. Tarla kapasitesi: % 27,76 -Solma noktası: % 14,75-Yararlı su:% 13,01
8. pH: Hafif Alkalin (7,55–7.81)
9. Kireç: Az kireçli (%0,57-0,80)
10. Organik madde: Fakir (%0,10–0,89)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (%0,07–0,16), Fosfor yetersiz (% 1,66–3,72)
Potasyum orta (%0,21–0,52)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli (5,30-6,93 ppm), Çinko yetersiz (0.094–0.128ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Erik, Vişne, Kayısı, Ceviz, Badem, Bağ, Ayva, Kiraz

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Marul, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fığ

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fığ, Korunga, Mürdümük

4-7. Kg3.d1B1t2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Koçgöz serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 3.sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda.
2. Sulu tarıma az uygun.
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120 cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Hafif eğimli (%2-6)
6. Tekstür: Killi
7. Tarla kapasitesi: % 27,76 -Solma noktası: % 14,75-Yararlı su:% 13,01
8. pH: Hafif Alkalin (7,55–7.81)
9. Kireç: Az kireçli (%0,57-0,80)
10. Organik madde: Fakir (%0,10–0,89)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (%0,07–0,16), Fosfor yetersiz (% 1,66–3,72)
Potasyum orta (%0,21–0,52)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli (5,30-6,93 ppm), Çinko yetersiz (0.094–0.128ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Erik, Vişne, Kayısı, Ceviz, Badem, Bağ, Ayva, Kiraz

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Marul, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

4-8. Kg4.Bt1 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Koçgöz serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 3.sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda.
2. Sulu tarıma az uygun.
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) II. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120 cm)-Az taşlı
5. Eğim: Hafif eğimli (%2-6)
6. Tekstür: Killi
7. Tarla kapasitesi: % 27,76 -Solma noktası: % 14,75-Yararlı su:% 13,01
8. pH: Hafif Alkalin (7,55–7.81)
9. Kireç: Az kireçli (%0,57-0,80)
10. Organik madde: Fakir (%0,10–0,89)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (%0,07–0,16), Fosfor yetersiz (% 1,66–3,72)
Potasyum orta (%0,21–0,52)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli (5,30-6,93 ppm), Çinko yetersiz (0.094–0.128ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Ceviz, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Yonca, Hayvan Pancarı, Silajlık Mısır, Sudan otu, Fiğ

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fiğ, Korunga, Mürdümük

5- KOVANLIK SERİSİ

5-1. Kn4.Bt2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde kovanlık serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 2. sınıf oldukça iyi tarım arazileri grubunda
2. Sulu tarıma az uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Hafif eğimli (% 2-6)
6. Tekstür: Killi Tın.
7. Tarla kapasitesi: % 26.81 -Solma noktası: %15.75-Yararlı su:% 11,05
8. pH: Hafif Alkalin (7,75–7,99)
9. Kireç: Fazla Kireçli (% 8,86–15,58)
10. Organik madde: Fakir (% 0,45–1,90)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (%0,05-0,15), Fosfor orta (%5,15-36,44)
Potasyum orta (% 1,29-2,48)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli(4,73-6,19 ppm), Çinko yetersiz (0,160–0,361 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Erik, Vişne, Ceviz, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

5–2. Kn3.d1C1t2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde kovanlık serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 3. sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda
2. Sulu tarıma az uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Orta eğimli (% 6-12)
6. Tekstür: Killi Tın.
7. Tarla kapasitesi: % 26.81 -Solma noktası: %15.75-Yararlı su:% 11,05
8. pH: Hafif Alkalin (7,75–7,99)
9. Kireç: Fazla Kireçli (% 8,86–15,58)
10. Organik madde: Fakir (% 0,45–1,90)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (%0,05-0,15), Fosfor orta (%5,15-36,44)
Potasyum orta (%1,29-2,48)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli(4,73-6,19 ppm), Çinko yetersiz (0,160–0,361 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Erik, Vişne, Ceviz, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fig

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fig, Korunga, Mürdümük

6- KURTALAR SERİSİ

6-1. Kl3.d2C1t2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Kurtlar serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özelliklerini

1. 3. sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda
2. Sulu tarıma az uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Orta derin toprak yapısında (50-90 cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Orta Eğimli (%6-12)
6. Tekstür: Kil
7. Tarla kapasitesi: % 32,37 -Solma noktası: % 21,06-Yararlı su: %11,31
8. pH: Hafif Alkalin (7,81-8,01)
9. Kireç: Kireçli (%0,79- 1,59)
10. Organik madde: Fakir (% 0,37-0,74)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (% 0,04-0,08), Fosfor orta (% 1,80-7,83)
Potasyum orta (% 0,73-1,10)
12. Mikro Elementler: Demir orta(3,14-5,16 ppm), Çinko yetersiz (0,026-0,206 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Erik, Vişne, Ceviz, Badem, Bağ, Ayva, Kiraz

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fig

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fig, Korunga, Mürdümük

6–2. Kl3.d2B1t3 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Kurtlar serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 3. sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda
2. Sulu tarımda özel bitkilere uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) IV. Sınıf
4. Derinlik: Orta derin toprak yapısında (50-90 cm)-Çok taşlı
5. Eğim: Hafif Eğimli (%2-6)
6. Tekstür: Kil
7. Tarla kapasitesi: % 32,37 -Solma noktası: % 21,06-Yararlı su:%11,31
8. pH: Hafif Alkalin (7,81-8,01)
9. Kireç: Kireçli (%0,79- 1,59)
10. Organik madde: Fakir (% 0,37-0,74)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (% 0,04-0,08), Fosfor orta (% 1,80-7,83)
Potasyum orta (% 0,73-1,10)
12. Mikro Elementler: Demir orta(3,14-5,16 ppm), Çinko yetersiz (0,026-0,206 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Ceviz, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fig

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fig, Korunga, Mürdümük

6–3. Kl3.d3C1t3 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Kurtlar serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 3. sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda
2. Sulu tarımda özel bitkilere uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) IV. Sınıf
4. Derinlik: Sığ toprak yapısında (30-50 cm)-Çok taşlı
5. Eğim: Orta Eğimli (%6-12)
6. Tekstür: Kil
7. Tarla kapasitesi: % 32,37 -Solma noktası: % 21,06-Yararlı su:%11,31
8. pH: Hafif Alkalin (7,81-8,01)
9. Kireç: Kireçli (%0,79- 1,59)
10. Organik madde: Fakir (% 0,37-0,74)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (% 0,04-0,08), Fosfor orta (% 1,80-7,83)
Potasyum orta (% 0,73-1,10)
12. Mikro Elementler: Demir orta(3,14-5,16 ppm), Çinko yetersiz (0,026-0,206 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

6-4. Kl4.d1C1t3 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Kurtlar serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 3. sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda
2. Sulu tarımda özel bitkilere uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) IV. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında (90-120 cm)-Çok taşlı
5. Eğim: Orta Eğimli (%6-12)
6. Tekstür: Kil
7. Tarla kapasitesi: % 32,37 -Solma noktası: % 21,06-Yararlı su:%11,31
8. pH: Hafif Alkalin (7,81-8,01)
9. Kireç: Kireçli (% 0,79- 1,59)
10. Organik madde: Fakir (% 0,37-0,74)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (% 0,04-0,08), Fosfor orta (% 1,80-7,83)
Potasyum orta (% 0,73-1,10)
12. Mikro Elementler: Demir orta(3,14-5,16 ppm), Çinko yetersiz (0,026-0,206 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Ceviz, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

6–5. Kl2.d3D2t3 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Kurtlar serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikler

1. 4. sınıf tarımda kullanımı sınırlı araziler grubunda
2. Sulu tarımda özel bitkilere uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) IV. Sınıf
4. Derinlik: Sığ toprak yapısında (30-50 cm)-Çok taşlı
5. Eğim: Dik Eğimli (%12-20)
6. Tekstür: Kil
7. Tarla kapasitesi: % 32,37 -Solma noktası: % 21,06-Yararlı su:%11,31
8. pH: Hafif Alkalin (7,81-8,01)
9. Kireç: Kireçli (% 0,79- 1,59)
10. Organik madde: Fakir (% 0,37-0,74)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (% 0,04-0,08), Fosfor orta (% 1,80-7,83)
Potasyum orta (% 0,73-1,10)
12. Mikro Elementler: Demir orta(3,14-5,16 ppm), Çinko yetersiz (0,026-0,206 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

6-6. Kl4.d1Bt2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Kurtlar serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özelliklerı

1. 2. sınıf oldukça iyi tarım arazileri grubunda
2. Sulu tarıma az uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında (90-120 cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Hafif Eğimli (%2-6)
6. Tekstür: Kil
7. Tarla kapasitesi: % 32,37 -Solma noktası: % 21,06-Yararlı su:%11,31
8. pH: Hafif Alkalin (7,81-8,01)
9. Kireç: Kireçli (% 0,79- 1,59)
10. Organik madde: Fakir (% 0,37-0,74)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (% 0,04-0,08), Fosfor orta (% 1,80-7,83)
Potasyum orta (% 0,73-1,10)
12. Mikro Elementler: Demir orta(3,14-5,16 ppm), Çinko yetersiz (0,026-0,206 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Erik, Vişne, Ceviz, Badem, Bağ, Ayva, Kiraz

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

6-7. Kl2.d2D2t3 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Kurtlar serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 4. sınıf tarımda kullanımı sınırlı araziler grubunda
2. Sulu tarımda özel bitkilere uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) IV. Sınıf
4. Derinlik: Orta derin toprak yapısında (50-90 cm)-Çok taşlı
5. Eğim: Dik Eğimli (%12-20)
6. Tekstür: Kil
7. Tarla kapasitesi: % 32,37 -Solma noktası: % 21,06-Yararlı su:%11,31
8. pH: Hafif Alkalin (7,81-8,01)
9. Kireç: Kireçli (% 0,79- 1,59)
10. Organik madde: Fakir (% 0,37-0,74)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (% 0,04-0,08), Fosfor orta (% 1,80-7,83)
Potasyum orta (% 0,73-1,10)
12. Mikro Elementler: Demir orta(3,14-5,16 ppm), Çinko yetersiz (0,026-0,206 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

6-8. Kl3.Bt2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Kurtlar serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 2. sınıf oldukça iyi tarım araziler grubunda
2. Sulu tarıma az uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında (90-120 cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Hafif Eğimli (%2-6)
6. Tekstür: Kil
7. Tarla kapasitesi: % 32,37 -Solma noktası: % 21,06-Yararlı su:%11,31
8. pH: Hafif Alkalin (7,81-8,01)
9. Kireç: Kireçli (%0,79- 1,59)
10. Organik madde: Fakir (% 0,37-0,74)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (% 0,04-0,08), Fosfor orta (% 1,80-7,83)
Potasyum orta (% 0,73-1,10)
12. Mikro Elementler: Demir orta(3,14-5,16 ppm), Çinko yetersiz (0,026-0,206 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Erik, Vişne, Badem, Bağ, Ayva, Kiraz

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

6-9. Kl3.Art2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Kurtlar serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 2. sınıf oldukça iyi tarım araziler grubunda
2. Sulu tarıma az uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) II. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında (90-120 cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Hafif dalgalı (%1-2)
6. Tekstür: Kil
7. Tarla kapasitesi: % 32,37 -Solma noktası: % 21,06-Yararlı su:%11,31
8. pH: Hafif Alkalin (7,81-8,01)
9. Kireç: Kireçli (%0,79- 1,59)
10. Organik madde: Fakir (% 0,37-0,74)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (% 0,04-0,08), Fosfor orta (% 1,80-7,83)
Potasyum orta (% 0,73-1,10)
12. Mikro Elementler: Demir orta(3,14-5,16 ppm), Çinko yetersiz (0,026-0,206 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Badem, Bağ, Kiraz

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

6-10. Kl3.d2B-C2t2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Kurtlar serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özelliklerı

1. 3. sınıf sorunlu tarım araziler grubunda
2. Sulu tarıma az uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Orta derin toprak yapısında (50-90 cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Hafif-Orta eğimli (%2-12)
6. Tekstür: Kil
7. Tarla kapasitesi: % 32,37 -Solma noktası: % 21,06-Yararlı su:% 11,31
8. pH: Hafif Alkalin (7,81-8,01)
9. Kireç: Kireçli (%0,79- 1,59)
10. Organik madde: Fakir (% 0,37-0,74)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (% 0,04-0,08), Fosfor orta (% 1,80-7,83)
Potasyum orta (% 0,73-1,10)
12. Mikro Elementler: Demir orta(3,14-5,16 ppm), Çinko yetersiz (0,026-0,206 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Badem, Bağ, Kiraz

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

6-11. Kl4.d1Bt3 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Kurtlar serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 3. sınıf sorunlu tarım araziler grubunda
2. Sulu tarımda özel bitkilere uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) IV. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında (90-120 cm)-Çok taşlı
5. Eğim: Hafif eğimli (%2-6)
6. Tekstür: Kil
7. Tarla kapasitesi: % 32,37 -Solma noktası: % 21,06-Yararlı su:% 11,31
8. pH: Hafif Alkalin (7,81-8,01)
9. Kireç: Kireçli (%0,79- 1,59)
10. Organik madde: Fakir (% 0,37-0,74)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (% 0,04-0,08), Fosfor orta (% 1,80-7,83)
Potasyum orta (% 0,73-1,10)
12. Mikro Elementler: Demir orta(3,14-5,16 ppm), Çinko yetersiz (0,026-0,206 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

6-12. Kl4.Bt2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Kurtlar serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 2. sınıf oldukça iyi tarım araziler grubunda
2. Sulu tarıma az uygun
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında (90-120 cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Hafif eğimli (%2-6)
6. Tekstür: Kil
7. Tarla kapasitesi: % 32,37 -Solma noktası: % 21,06-Yararlı su:%11,31
8. pH: Hafif Alkalin (7,81-8,01)
9. Kireç: Kireçli (%0,79- 1,59)
10. Organik madde: Fakir (% 0,37-0,74)
11. Makro Elementler: Azot Yetersiz (% 0,04-0,08), Fosfor orta (% 1,80-7,83)
Potasyum orta (% 0,73-1,10)
12. Mikro Elementler: Demir orta(3,14-5,16 ppm), Çinko yetersiz (0,026-0,206 ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Badem, Bağ, Kiraz

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

7- SIRÇALIK SERİSİ

7-1 Sr3.Bt2 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Sırçalık serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 3.sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda.
2. Sulu tarıma orta uygun.
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) III. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120 cm)-Orta taşlı
5. Eğim: Hafif eğimli(%2-6)
6. Tekstür: Kil.
7. Tarla kapasitesi: % 43.08 -Solma noktası: %27.99-Yararlı su:%15,08
8. pH: Hafif Alkalin (7,15–7.83)
9. Kireç: Az kireçli (%0.79–0.87)
10. Organik madde: Fakir (%0,46–2.21)
11. Makro Elementler: Azot Az(%0,04–0,07),Fosfor az(%2.11–8.34),
Potasyum yeterli (%0,46-0.76)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli(5.88–7.21 ppm),Çinko yetersiz (0.012–0.247ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Badem, Bağ, Kiraz

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

7–2 Sr3.Art1 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Sırçalık serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 3.sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda.
2. Sulu tarıma orta uygun.
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) II. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120 cm)-Az taşlı
5. Eğim: Hafif dalgalı (%1-2)
6. Tekstür: Kil.
7. Tarla kapasitesi: % 43.08 -Solma noktası: %27.99-Yararlı su:%15,08
8. pH: Hafif Alkalin (7,15–7.83)
9. Kireç: Az kireçli (%0.79–0.87)
10. Organik madde: Fakir (%0,46–2.21)
11. Makro Elementler: Azot Az(%0,04–0,07),Fosfor az(%2.11–8.34),
Potasyum yeterli (%0,46-0.76)
12. Mikro Elementler: Demir yeterli(5.88–7.21 ppm),Çinko yetersiz (0.012–0.247ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Ceviz, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Bamya, Fasulye, Börülce, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fıg

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fıg, Korunga, Mürdümük

7-3 Sr4.At1 Sırçalık köyü sınırları içerisinde Harita üzerinde Sırçalık serisi adı ile kodlandırılan tarım arazilerinin özellikleri

1. 3.sınıf sorunlu tarım arazileri grubunda.
2. Sulu tarıma orta uygun.
3. AKK(Arazi kullanım kabiliyet sınıfı) II. Sınıf
4. Derinlik: Derin toprak yapısında(90-120 cm)-Az taşlı
5. Eğim: Düz (%0-1)
6. Tekstür: Kil.
7. Tarla kapasitesi: % 43.08 -Solma noktası: %27.99-Yararlı su:%15,08
8. pH: Hafif Alkalin (7,15–7.83)
9. Kireç: Az kireçli (%0.79–0.87)
10. Organik madde: Fakir (%0,46–2.21)
11. Makro Elementler: Azot Az(%0,04–0,07),Fosfor az(%2.11–8.34),
Potasyum yeterli (%0,46-0.76)
12. Mikro Elementler:Demir yeterli(5.88-7.21 ppm),Çinko yetersiz (0.012-0.247ppm)
13. Toprak tekstürüne bağlı olarak damla sulama yöntemi önerilmektedir.

Ürün Deseni Önerisi:

Sulu Şartlarda;

Meyvecilik:

Elma, Armut, Ayva, Erik, Vişne, Ceviz, Badem, Bağ

Sebzecilik:

Domates, Biber, Patlıcan, Bamya, Fasulye, Börülce, Kavun, Karpuz

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Anason, Kimyon, Haşhaş

Baklagiller:

Nohut, Mercimek, Fasulye

Yem Bitkileri:

Fiğ

Kuru Şartlarda;

Meyvecilik:

Bağ, Badem

Hububat:

Buğday, Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar

Endüstri Bitkileri:

Kimyon, Haşhaş, Anason

Baklagiller:

Nohut, Mercimek

Yem Bitkileri:

Fiğ, Korunga, Mürdümük

MEYVELER			
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİLER			
Tür	Anaç		Çeşit ve Tozlayıcılar
Elma	Derin Top.(90 cm yukarı)	Sığ- Orta derin 30–90 cm arası	Red delicious grubu (Red chief, Scarlet spur, Starkrimson delicious, Starking delicious, Clear red) Golden d. Grubu (Golden Reinders, Golden Smoothe, Starks spur golden) Jonagold grubu(Triploid) Jonagored Gala grubu (Galaxy gala, Mondial gala) Braeburn grubu, Fuji grubu, Summerred, Jerseymac (erkenci)
	Çögür MM109 MM111 MM106(ağır top. Hassas) M26(spur çeşitlere) M9	M26 M9	
Armut	Yabani armut, OHXF333 klonanacı BA 29 Quince A	BA 29 Quince A	Abete fetel, Deveci, Keiffer, June Beauty, June Gold, Morettini, D. D. Comice, Santa Maria, Williams, Ankara

SERT ÇEKİRDEKLİLER			
Tür	Anaç		Çeşit ve Tozlayıcılar
Kiraz	İdris(Mahlep)Kurak şartlara dayanıklı Kuş Kirazı (Kuvvetli anaç) Maxma 14 Yarı bodur SL 64 (idris klonu) Gisela 6 Yarı bodur		0900 Ziraat X (Starks gold, Bigarreau goucher, Lambert, Stella) Sweet Heart, Stella, Van X Bigarreau goucher, Bing, (Bahçe tesis ederken en az üç çeşit tozlayıcı bulunmalıdır.)
Şeftali ve Nektarin	Çögür GF677 Myrobolan 29C		Redheaven, Red globe, Glohaven, Creast haven, Monroe, Elegand lady (Orta geç ve geç çeşitler) Nektarin: Sweet lady, Silver lite, Fairline, Caldesi 2020 Spring time, Early red, Dixired erkenci
Kayısı	Zerdali A, Zerdali Myrobolan 29C (Klonal anaç) Myrobolan GF31 (Klonal anaç) Orta derinde Klonal anaç tercih edilmelidir.		Roksana, Aprikos(Iğdır), Hasanbey, Alyanak, Şekerpare
Erik	Yabani Erik Myroblon29-C Pixy		Orta mevsim (Black Diamond Black Beauty, Ozark Premier) Geççiler (Angeleno, TC Sun, Autumn giant, October sun) Avrupa grubu (Stanley, President, Frenze 90) İlkbahar geç donları risk orta-geççi çeşitler önerilmektedir.
Vişne	Mahlep, SL-64		Kütahya

SERT KABUKLULAR		
Tür	Anaç	Çeşit ve Tozlayıcılar
Badem	Acıbadem (kuru alanlarda) GF677 (Sulu alanlarda)	Ferragnes X Ferroduel X Ferrostar, (geç çiçek açan çeşitler) Teksas X Nonpareil X Ne plus ultra (orta geççi çeşitler) İlkbahar geç donlardan etkilenme riskinden orta ve geççi çeşitler önerilmektedir
Ceviz	Yabani ceviz Balaban	Chandler, X Franquette, Şebin X Bilecik (geççi çeşitler)

BAĞ ANAÇ ve ÇEŞİTLERİ

Tür	Anaç	Çeşit ve Tozlayıcılar
Bağ	99 R 110 R SO-4 420-A 1103 P 41-B 140 Rug.	Kadınparmağı, Alfons, Royal, Mevlana(Çardak terbiye sistemi), Razaki, İtalya, Red globe(Olgunlaşma riski olabilir), (sofralık), Sultani Çekirdeksiz, Hamburg Misketi Çal karası, Kalecik karası, Boğazkere, Öküzgözü (Rakım 850 metreden yükseklerde tavsiye edilmemeli, Taban alanlarda olgunlaşma riski var. Sığ toprak ve güney yamaçlara tavsiye edilmeli, sanayilik)

MEYVELERDE DİKİM ARALIKLARI

Tür	Anaç	Sıra Arası (m)	Sıra Üzeri (m)
Bağ		3,5	2
		4	2–2,5
Elma	M9	3,5	1–1,5
	M106	4	2–2,5
	M111	4	3–3,5
	Çögür(Normal çeşit)	5	4
	Çögür(Spur çeşit)	4	1,5–2
Armut	BA29	4	2
	Quince A	4	2,5–3
	OHF*333	4	3–4
	Çögür	4	4
	Çögür	5	5
Kiraz	Gisela6 Maxma14	4	4
	Gisela6 Maxma14	5	3–5
	Çögür	6	6
	Çögür	7	7
Kayısı	Vegetatif anaçlar	5	4–5
	Çögür Anaçlar	8	6–8
Şeftali	Vegetatif anaçlar	5	3–4
	Çögür Anaçlar	4	4
	Çögür Anaçlar	5	5
Erik	Vegetatif anaçlar	5	4–5
	Çögür Anaçlar	8	7
Badem	GF677	5	5
	GF677	6	6
	Çögür Anaçlar	6	6
	Çögür Anaçlar	7	7
Ceviz	Çögür Anaçlar	8	8
	Çögür Anaçlar	10	10

SERİN İKLİM TAHILLARI

Buğday	Makarnalık	Çeşit 1252, Kızıltan 91, Yelken, Kunduru 1149 (organik madde yüksek ister.)
	Ekmeklik	Pehlivان (sulu alanlara özellikle geçi bölgeleri için) Demir2000(kuraklığa performansı iyi), Tosunbey Bayraktar2000 (Kuruda 200–300 kg (kuraklığa en dayanıklı) Bezostaya, Atay 85, Gerek 79
Arpa	Yemlik ve sanayilik	Tarm92, Karatay94, Tokak, Kral 97, Erginel 90(6 sıralı)
Tritikale	Yemlik ve sanayilik	Tatlıcak 97(yüksek yerlere), Karma 2000,Presto
Yulaf, Çavdar	Yemlik ve sanayilik	Faikbey, Seydişehir, Checota

BAKLAGİLLER

(ph yüksek olan yerler için önerilir pH5,5–9 arası.)

Nohut	Sanayilik,	Sarı 98 (sarileblebilik), Hisar (Kırmızı, Antraknoza kısmen dayanıklı)
	Sofralık	Gökçe, Sarı 98, Yaşa 05, Menemen–92, Uzunlu, Er, Işık 05
Mercimek		Meyveci2001, Sultan 1 (yazlık yeşil)
Fasulye	Kuru (Dane)	Noyanbey–98, Akman–98, Göynük, Yunus, Önceler(Barbunya)
	Taze	Ticari çeşitler, Barbunya
Börülce		Karagöz, Akız (Ege Ziraat), (Poyraz)Bioteck firma
Bakla	Yeşil gübre	Eresen 87
Bezelye		Ticari çeşitler

ENDÜSTRİ BITKİLERİ

Şeker pancarı		Signal
Patates	Derin toprak, organik madde, Kumlu tınlı Yemeklik	(Orta ekinci)MARABEL, (Orta geççi)AGRİA, MARFONA, LATONA, WANGOGH, FABULO, PROVENTA
	Sanayilik	AGRİA
Haşhaş		TMO1, TMO2, TMO3
Mısır		Tatlı Mısır, Cindarı, Sanayilik tohumları, Ticari çeşitler
Anason		Yerel çeşitler
Kimyon		Yerel çeşitler
Kekik		İzmir Kekiği
Ayçiçeği	Yağlık	Ticari çeşitler
	Çerezlik	Ticari çeşitler

SEBZE		
Domates		Sofralık ve Sanayilik F1 ve Kompozit çeşitler
Biber		Sofralık ve Sanayilik F1 ve Kompozit çeşitler
Kavun		Ticari F1 çeşitler
Karpuz		Ticari F1 çeşitler
Lahana		Ticari F1 çeşitler
Kırmızı Lahana		Ticari çeşitler
Brokoli		Ticari çeşitler
Bamya		Ticari çeşitler
Karnıbahar		Ticari çeşitler
Kabak		Ticari F1 çeşitler
Havuç		Ticari F1 çeşitler
Ispanak		Ticari F1 çeşitler
Marul		Ticari F1 çeşitler
Maydanoz		Ticari çeşitler
Tere		Ticari çeşitler
Roka		Ticari çeşitler
Nane		
Soğan		Sofralık ve Sanayilik F1 ve Kompozit çeşitler

YEM BİTKİLERİ		
Yonca		Bilensoy 80(soğuk yerler için), Alsancak, Ticari çeşitler(Dormantlık düzeyi 7-7,5 olmalıdır.)
Fig	Macar fig.	Altınova 2002, Budak, Ege Beyazı 79, Oğuz-2002
	Adi fig.	Selçuk 99, Cumhuriyet 99, Kubilay 82
Korunga		Özerbey-03, Lütfi Bey
Mürdümük		Gürbüz-2001
H.Pancarı		Ticari çeşitler
S.Mısır		Kompozit Arifiye, Ticari çeşitler
Sudan Otu		Gözde 80, Ticari çeşitler

ARMUT ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ



Fransız kökenli, ağaçları orta kuvvette, yarı dik gelişen verimli erken meyveye yatan bir çeşittir. Ateş yanıklığı hastalığına kısmen dayanıklıdır. Meyve kabuk rengi; yeşil zemin üzerine az paslı, iri (275 gr.), konik biçiminde, boyun kısmı uzundur. Meyve eti beyaz, çok sulu, tatlı, hoş kokulu ve az kumludur. Eylül ayının son haftası hasat edilir. Dölleyicileri; Williams, Coscia, B. Hardy, Passe Cressane' dir.

ABETE FETEL



DEVECİ

Kökeni Anadolu olup, ağaçları orta kuvvette, yarı yayvan gelişen bir çeşittir. Meyveleri iri, iyi bakım koşullarında çok iri, basık, alt kısmı geniş, boyunsuz, çiçek çukuru derindir. Ateş yanıklığı bakteriyel hastalığına duyarlıdır. Kabuk rengi sarı-yeşil zemin üzerine al yanaklıdır. Meyve eti beyaz, gevrek, sulu ve lezzetlidir. Mükemmel yeme kalitesine sahip olup soğuk hava tesislerinde uzun süre muhafaza edilir. Ekim ayının 2.haftası olgunlaşır. Dölleyicileri; Akça Passe Crassane, June Gold ve Williams dölleyici çeşitleridir.




JUNE BEAUTY

Anadolu'dan yayılan, ağaçları yarı dik ve çok kuvvetli gelişme gösteren erkenci armut çeşitlerinden olup ülkemizde Haziran Güzeli, Haziran Gülü olarak da bilinmektedir. Ağaçları çok verimli, meyveleri orta iriliktedir. Kabuk rengi; yeşil zemin üzerine kırmızı yanaklı, sulu, tatlı ve kokuludur. Meyve eti sarımsı beyaz renkte, meyve hafif kumludur. Meyveleri aynı zamanda hasat olumuna gelmediği için derimin 2-3 seferde yapılması gereklidir. Dölleyicileri; Santa Maria ve Williams çeşitleridir.



SANTA MARIA

Ağaçları yarı dik ve kuvvetli gelişen, oldukça verimli bir çeşittir. Sofralık tüketime uygun olduğu kadar sanayiye de uygun bir çeşittir. Meyve iri (250 gr civarında), uzun konik şeklinde, çiçek cukuru geniş, sap tarafı dar ve küttür. Meyve kabuğu sarımtırak-yeşil renkte olup güneş gören tarafı kırmızı yanaklıdır. Meyve eti krem renginde çok sulu ve gevrektdir. Dölleyicileri; Abate Fetel ve Beurre Hardy çeşitleridir.



KIEFFER

Ağaçları yarı dik ve çok kuvvetli gelişen çok verimli, uzun ömürlü bir çeşit olup ateş yanıklığı hastalığına kısmen dayanıklılığı nedeniyle yetiştiriciliği yaygınlaşmaktadır. Margaret Marilya olarak da bilinir. Meyveleri, orta büyüklükte, iyi bakım koşullarında iridir. Meyvenin sap ve çiçek kısımları dar olup orta kesimi oldukça şişkindir. Yeşil sarı zemin üzerine güneş gören kısımlar kırmızı beneklidir. Meyve eti beyaz, kumlu, orta sulu ve lezzetlidir. Ekim ayının ilk haftası hasat olumuna gelmekte, soğuk hava koşullarında uzun süre depolanabilmektedir. Sıcak ve soğuk hava koşullarına olan toleransı iyidir. Kendine kısmen verimli olmakla birlikte Williams (Bartlet) çeşidi dölleyici olarak dikilebilir.



**WILLIAMS
(BARTLET)**

İngiltere orijinli, ağaçları yarı dik ve kuvvetli gelişen erken verime yatan, geç çiçeklenen ve düzenli verim alınan bir çeşittir. Ülkemizde olduğu gibi armut yetiştirilen ülkelerde en yaygın yetiştirilen kaliteli çeşitler arasında yer almaktadır. ABD'de Bartlet olarak bilinir. Meyveleri iri, koni şeklinde, kabuk rengi açık yeşilimsi-sarı, güneş gören kısımlarda kırmızı-pembe yanak yapar. Meyve taze tüketime, hem de sanayiye uygundur. Soğuk hava tesislerinde uzun süre muhafaza edilebilir. BA-29 anacı ile iyi uyuşur. Dölleyicileri; Abate Fetel, Akça, B. Hardy, Passe Crassane'dir.

AYVA ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ



Ülkemizde yetiştirilen en önemli çeşitler arasında yer almaktır olup yetiştirciliği son yıllarda ilimizde yaygınlaşmıştır. Yarı dik gelişir ve geniş taç oluşturur. Çok verimli bir çeşit olup meyve orta-iri, iri, yuvarlak geniş karınlı, sapa doğru dar, meyve silindirik, sap kısmı uzunca, çiçek kısmı küttür. Meyve eti gevrek, sulu, mayhoş, boğucu değildir. Sofralık değeri yüksektir. Diğer ayvalarda olduğu gibi Ateş Yanıklığına hassastır. Uygun koşullarda 5 ay muhafaza edilebilir.

EŞME



Son yıllarda yetiştirciliği artan ve tüketiciler tarafından aranan bir çeşittir. Ağacı, orta kuvvette gelişir, önce dikine büyür, ağaç yaşlandıkça dallarda sarkmaya başlar. Meyveler toparlak, sap tarafına doğru uzunca, kabuk limon sarısı renginde, havlı, kalın ve sert, eti; sarımtırak, gevrek, bol sulu ve mayhoştur. Eylül sonrasında hasat edilir ve meyveleri soğuk hava koşullarında 3–4 ay muhafaza edilir.

LİMON

ELMA ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ



M 9 (Çok Bodur)

Bodur anaçlar içinde dünyada en çok kullanılan anaçtır. Bu anaç üzerine aşılanacak elma çeşitlerinin %65–70 oranında bodurlaşmalarını sağlar. Su tutan taban arazilerde iyi sonuç vermez. Verimli topraklarda daha iyi gelişir.

Dikimden itibaren ömrü boyunca desteği ihtiyaç duyar. Dikimden hemen ertesi yıl meyve vermeye başlar. Bahçelerde ağaçlar ince iğ şekli terbiye sistemine göre şekillendirilir ve budanır. Bu sistemi kullanmanın amacı; dikimi izleyen ilk yıllardan itibaren daha erken yaşlarda arazinin tamamını meyve dal ve dalcıkları ile kaplayarak birim alandan azami ürün alınmasıdır.

M9 anacı üzerine aşılanan çeşitlerle oluşturulan ağaçlar 15–20 yıl, hatta daha uzun yıllar bahçede kalırlar. Verimli topraklarda ağaç başına 60–70 kg'a kadar ürün alınabilir. Dekara düşecek ağaç sayısı en az 80–100 adet, verimli topraklarda ise 140–150 adettir. Dekardan 6–8 ton ürün alınabilir.



**MM 106
(Yarı Bodur)**

Bugün dünyada ve yurdumuzda en çok tercih edilen anaç olup, hem yarı bodur (Spur tipi) anaçlar, hem de özellikle kuvvetli gelişen çeşitler için uygun bir anaçtır. Çok iyi kök sistemi oluşturur ve kazıkla desteklemeye ihtiyaç göstermez.

Yarı bodur ağaçlar oluşturur, dikimi izleyen 2-3'üncü yıllarda önemli ölçüde meyveye yatar. MM 106 üzerine yarı bodur gelişen (Starkrimson Delicious, Starkspur Golden Delicious) çeşitler aşılanmış fidanlardan bahçe kurulacağı zaman, ağaçları kuvvetlendirmek için 2 yıl meyve almayıp çiçekleri koparmak gereklidir.

Üzerine kuvvetli gelişen çeşitler aşılandığında değişik doruk dallı (modifiye lider), yarı bodur çeşitler aşılandığında ise çam şekli (bir lider ve çok sayıda yan dallı) terbiye sistemi tavsiye edilmektedir.



BREABURN

Dünyada en çok dikilen elma çeşitleri arasındadır. Orta ile iri arası meyve verir. Tatlı, sulu, gevrek, yeme kalitesi iyi, hafif asitli, asit şeker dengesi çok iyi ve mükemmel bir hoş kokusu vardır. Ağaçları orta kuvvetli büyür ve çok verimlidir. Diğer çeşitlere göre erken çiçek açar. Isparta koşullarında Ekim'in 2.haftasında hasat edilir. Depolama ömrü oldukça uzundur. Kendine verimli bir çeşittir. Tozlayıcıları Granny Smith, Fuji, Golden ve Gala'dır. M9, MM26 ve MM 106 anaçları kullanılabilmektedir. En büyük problemlerinden biri bazı bölgelerde renklenme sorunu olmasıdır. Renk oluşumunu desteklemek ve depoda meydana gelecek fizyolojik bozulmaları önlemek amacıyla aşırı azot uygulamasından kaçınmak gereklidir.



FUJİ

Meyveleri orta irilikte, tatlı, sulu, gevrek, sert ve yeme kalitesi iyidir. Ağaçları kuvvetli gelişir ve oldukça verimlidir. Meyve seyrelmesi iyi yapılmalıdır aksi takdirde peryodisite gösterir. Hasat zamanı Ekim'in 2.haftasıdır. Depolama ömrü oldukça uzundur. Karalekeye dayanıklı, mildiyöye biraz hassastır. Kendine verimli olmasına karşılık tozlayıcı olarak Granny Smith, Gala ve Golden elma çeşidinin kullanılması verim artışına neden olur. Meyvelerde renk oluşması için ağacın iç ve alt kısmına iyi bir güneş ışığı girişine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle M-9 anacı kullanılması tavsiye edilir. Son yıllarda farklı ülkelerde ıslah edilen ve daha kolay renk oluşturan "KuKi 8, FUJİ ZEHN ASTEC ve TOSHIRA" gibi patentli çeşitleri vardır.



GALA

Dünyada, çok sayıda ülke tarafından dikilen elma çeşididir. Meyveleri orta irilikte, tatlı, sulu, sert, gevrek ve yeme kalitesi çok iyidir. Ağaçları kuvvetli gelişir ve oldukça verimlidir. Her yıl düzenli meyve elde edebilmek için meyve seyrelmesi iyi yapılmalıdır. En önemli sorunu renk oluşumunun zayıf olmasıdır. Ancak son yıllarda daha erken dönemde renklenen "Schiniga Gala, Anno Glo Gala, Brookfield Gala, Buckeye Gala" çeşitleri geliştirilmiştir. Normal soğuk hava depolarında 3–4 ay, atmosfer kontrollü soğuk hava depolarında ise 6–7 ay depolanabilmektedir. Tüm çeşitler için iyi bir tozlayıcıdır. Kendine verimli olmasına rağmen kendi zamanında çiçek açan diploid bir çeşidin Gala'ya tozlayıcı olarak kullanılması verimi arttırır.



GOLDEN REİNDERS



JERSEY MAC



JONAGOLD

Uygun seyreltme yapılrsa ağaç peryodisite göstermez ve meyveler iri olur. Meyveler; tatlı, sulu, gevrek, sert ve yeme kalitesi iyidir. Soğuk hava depolarında 160–170, atmosfer kontrollü depolarda ise 310–320 gün muhafaza edilebilir. Acı benek, depo yanıklığı ve diğer depo bozukluklarına karşı yapraktan kalsiyum uygulanmalıdır. Tam çiçeklenmeden 145–155 gün sonra, bölgelere göre ise Eylül’ün ikinci haftası ile Ekim'in ilk haftası arasında hasat edilir. Ağaçları kuvvetli geliştiğinden M-9 anacına aşılı fidanlar kullanılmalıdır. Güneş yanıklığından etkilendiğinden dolayı ağ ile kapatılması tavsiye edilir. MM-106 anacına aşılı fidanlar sık dikilerek güneş yanıklığı etkisi azaltılabilir. Tozlayıcıları; Granny Smith, Fuji, Gala'dır.

Ağaçları orta kuvvette gelişir ve çok verimlidir. Meyveleri orta irilikte ve şişkindir. Meyve kabuğu açık yeşil zemin üstüne kırmızıdır. Meyve eti beyaz, sulu, biraz mayhoştur. Uygun hasat zamanı için tam çiçeklenmeden hasada kadar 100–110 gün geçmelidir. Isparta yöresinde Temmuz ayının 2. haftası başlayıp iki-üç defada toplama gerektir. Raf ömrü kısa olması en büyük sorunudur. Golden Delicious, Granny Smith ve Gala tozlayıcı olarak kullanılır. M-9 anacı üzerine aşılanırsa çok renkli meyveler elde edilir. MM106 anacı üzerine aşilanacak olursa renkli meyveler elde edebilmek için dalların geniş açıyla büyütülmesi gereklidir.

A.B.D. orijinli, ağaçları oldukça kuvvetli yayvan ve hızlı gelişen, oldukça verimli bir çeşit olduğu için tam bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aşlanması tavsiye edilir. Meyveleri orta irilikte, iyi koşullarda iridir. Meyve; hafif uzun-silindirik, sert et dokuludur. Kabuk rengi, açık yeşil zemin üzerine kırmızıdır. Meyve eti krem renginde, tatlı, sulu ve lezzetlidir. Uzun süre soğuk muhafazaya uygun olup taze tüketim yanında sanayi için de önerilmektedir. Eylül ayının ilk haftasında hasat edilir. Tozlayıcıları; Fuji, Gala Grubu, Red Delicious ve Granny Smith çeşitleridir.



RED CHIEF

Zayıf gelişir, erken yaşlarda verime yatar ve çok verimlidir. Meyve seyreltilmesi iyi yapılmalı aksi takdirde küçük meyve oluşumu görülür. Yarı kuvvetli gelişen MM.106 ve MM.111 anaçlarına aşılanır. Meyveleri seyreltme yapıldığında iri, konik küresel şekildedir. Meyve eti beyaz, tatlı, sert, sulu ve lezzetlidir. Normal soğuk hava depolarında 150–170, atmosfer kontrollü depolarda ise 250–270 gün muhafaza edilebilir. Golden Delicious, Granny Smith, Fuji, Golden Reinders ve Gala elma çeşitleri tozlayıcı olarak kullanılır. Karalekeye, mildiyöye ve ateş yanıklığına hassastır. İyi güneş alan birçok ülkede, üretilen ana çeşitler arasında yer almaktadır. Ülkemizde son yıllarda en fazla dikilen elma çeşitleri arasındadır.



SCARLET SPUR

Ağacı yarı kuvvetli gelişir. Oldukça verimli bir çeşittir. Meyveleri iri ve koni şeklindedir. Kabuk rengi koyu kırmızı, meyve eti tatlı, sulu, sert ve lezzetli bir çeşittir. Ağustos ayının sonunda rengi kırmızı renge döner. Özellikle renklenme problemi olan bölgelerde, kolay renklenmesinden dolayı bu çeşit tercih edilir. Bölgelere göre Eylül ortası ile Ekim'in ilk haftasında hasat edilir. Granny Smith, Golden Delicious çeşitleri tozlayıcı olarak kullanılır. Bu çeşit yarı bodur (MM106) ve klasik anaçlar üzerinde tercih edilir.



STARCRIMSON DELICIOUS

A.B.D. orijinli eski bir çeşit olmasına karşın, ülkemizde en fazla yetiştirilen çeşitler arasında yer almaktadır. Ağacı orta kuvvetli ve yarı dik gelişir. Arzulanan ürün kalitesinin alınması için tozlayıcı kullanılmalı ve yeterli miktarda meyve seyreltesmesi yapılmalıdır. Meyvesi orta irilikte ve kalitelidir. Kabuk; sarı zemin üzerine sıvama parlak kırmızı-morumsu renktedir. Meyve eti beyaz, sulu, sert ve lezzetlidir. Soğuk hava tesislerinde 7–8 ay süre muhafaza edilir. Hasat Zamanı; Golden Delicious'tan 5 gün öncedir. Tozlayıcıları; Golden Delicious, Granny Smith, Gala grubu, Braeburn ve Stark Spur Golden Delicious çeşitleridir.

ERİK ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ



ANGELENO

Ağaçları yarı yaygın ve çok güclü gelişme sağlar. Soğuklama ihtiyacı düşük olduğundan Ocak-Şubat ayları içersinde sıcak havalarda zamansız çiçeklenme oluşturarak, sonrasında olabilecek soğuklardan etkilenirler. Meyveleri iri, basık yuvarlak şekilli, siyah kabuklu ve kıraklıdır; sarı meye eti dayanıklıdır ve çekirdeğinden kolay ayrılır. Bölgelere göre Eylül ayın ikinci ile dördüncü haftasıdır. Aralık ayı sonuna kadar soğuk hava depolarında saklanabilir; hasat geciktirilirse tat kalitesi artar. Friar, Santa Rosa ve Papaz tozlayıcısı olarak kullanılır. Meyve seyretmesi yapılrsa daha iri meyveler elde edilir.



AUTUMN GIANT

Ağaçları oldukça kuvvetli gelişir ve yarı dik taç yapısı oluşturur. Meyve kabuğu sarı zemin üzerinde koyu pembe- kırmızı renginde, meyve oldukça iri, sert et dokulu, yuvarlak çiçek cukuru sıvrice, çekirdek ete bağlıdır. Meyve eti açık sarı renktedir. Eylül ayının son haftası hasat edilir. Tozlayıcıları; Friar, Santa Rosa, Black Amber çeşitleridir.



BLACK BEAUTY

Ağaçları geniş, hızlı ve çok kuvvetli gelişir. Orta verimli bir çeşittir ancak uygun tozlayıcılarla verim yüksektir. Meyveleri orta büyüklükte olup basık rengi siyaha yakın koyu mordur. Meyve seyreltmesi yapılrsa 55–60 mm meye elde edilir. Meyve uç kısmı hafif sıvridir. Meyve eti kırmızı sert, orta sulu bir çeşittir. Dayanıklı kendine hoş kokuludur. Akdeniz Bölgesinde Haziran ayının ikinci haftasında, rakım yükseldikçe Temmuz ayının üçüncü haftasına kadar hasat uzar. Kış ayları çok soğuk olmayan bölgelere uygundur. Tozlayıcıları Santa Rosa ve Quin Rosa'dır.



BLACK DIAMOND




PRESİDENT

Kaliforniya' da ıslah edilen Black serisi erikler içerisinde en kaliteli ve iri olan çeşitlerden biridir. Ağaçları kuvvetli gelişir, yayvan taç oluşturur ve seyrek dallıdır. Yaprakları canlı, parlak koyu yeşildir. Meyve iri, yuvarlak, çiçek ve sap çukurundan basık, meyve koyu mor-siyahımsı ve sarı beneklidir. Meyve eti koyu turuncu, sert ve çekirdek ete bağlıdır. Ağustos ayının 2. haftası hasat olumuna gelir. Dölleyicileri Santa Rosa, Friar, Black Gold ve Angeleno 'dır.

Avrupa grubu erikler içerisinde yer alan ve sofralık olarak tüketilen önemli çeşitlerden biridir. Ağaç yarı dik oldukça kuvvetli gelişir. Tozlayıcı olduğu takdirde meyve tutumu iyidir. Meyve iri, silindirik, dış kabuk koyu morumsu kırmızı, meyve eti sert, tatlı, sulu meyve eti sarımtırak yeşil renklidir. Yola dayanımı iyi olup 3–4 hafta soğuk depoda muhafaza edilebilir. Bursa şartlarında 5–15 Eylül tarihlerinde olgunlaşır. Bu çeşit için Stanley (Birton), D'Ente R.C.D'Altan çeşitleri tozlayıcı olarak kullanılabilir.

KAYISI ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ



ROXANA



ŞEKERPARE

Ağaçları kuvvetli gelişen seyrek dallı ve iri yapraklı, yayvan gelişen bir çeşittir. Meyve orta irilikte meyve tutumunun az olduğunda oldukça iridir. Meyve kabuğu sarı zemin üzerine koyu turuncu—kırmızı renktedir. Temmuz ayının 3. haftası hasat olumuna gelir. Geçit bölgeleri için önerilen sofralık bir çeşittir.

Hem sofralık hem kurutmalık özellikleri olan yerli çeşitlerimiz arasında yer alır. Ağaçları yayvan ve kuvvetli gelişir. Meyveleri 25–30 gr. Ağırlığında meyvede sap cukuru tarafı düz, karın çizgisi belirgin, meyve kabuğu sarı, turuncu olup belirgin kırmızı yanak yapar. Meyve eti sarımtırak turuncu, sulu, tatlıdır ve hoş kokuludur. Yarma bir çeşit olup çekirdek orta iri ve uzun Akdeniz Bölgesinde Haziran ayının 2. haftası olgunlaşır. Ülkemizin değişik bölgelerinde kayısı çeşitlerine Şekerpare ismi verilmekle birlikte Iğdır Şekerparesi en tanınmış olanıdır. Iğdır ve çevresinde sofralık ve kurutmalık olarak yetiştirilmektedir. Ağaç şekli yayvan olup kuvvetli büyür. Ağaçları yüksek verimlidir.

KİRAZ ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ



0900 ZİRAAT

Ağaçları çok kuvvetli ve dik gelişir. Kendine verimsiz olduğundan mutlaka tozlayıcı gereklidir. Meyveleri iri, uzun saplı, meyve kabuğu kırmızı, meyve eti açık kırmızıdır, sert, gevrek ve suludur. Taşımaya karşı dayanıklı olduğu için ihracatta istenilen bir çeşittir. Kiraz ihracatımızın %90'ını oluşturur. Hasat zamanı: Rakıma bağlı olarak değişmekle beraber 900–1000 m rakımda Haziran ayının 3. haftası ile son haftası arasındadır. Toros yayalarında 1500–2000 m de Temmuz ayının sonu, Ağustos ayının ilk haftasına kadar hasat uzamaktadır. Malatya'da Dalbastı, Çanakkale'de fis fis, Akşehir'de Akşehir Napolionu, Uluborlu'da Uluborlu Kirazı, Salihli'de Allah Diyen olarak bilinir. Lambert, Starks Gold, Regina, Bigarreau Gouceher tarafından tozlanır. Regina'dan 2–3 gün önce çiçek açar.



LAMBERT

ABD kökenli, ağaçları orta kuvvette, dik gelişen çok verimli bir çeşittir. Birçok çeşide tozlayıcı olarak kullanılır. Meyveleri iri, 8,5- 9,5 gr ağırlığında, kalp şeklinde, meyve kabuğu morumsu kırmızı renktedir. Meyve eti sert, kırmızı renkli, orta sulu ve kalitelidir. Yola dayanımı iyi, ancak çatlamaya hassas bir çeşittir. Haziran ayının üçüncü haftasında olgunlaşır. Dölleyicisi Van B. Gaucher, Marton Bigarreau çeşitleridir.



STARKS GOLD

Orijini Kanada'dır. Ağaçları yarı kuvvetli ve dik gelişir. Çok verimlidir. Meyveleri orta irilikte meyve kabuğu sarı renktedir, meyve eti sert, orta sulu ve lezzetlidir. Sofralık kalitesi iyi değildir. Sanaiye uygun bir çeşittir. Çekirdekleri çıkarılarak ihraç edilmekte ve değişik gıda boyalarıyla boyanarak sanayide kullanılmaktadır. Hasat zamanı: Haziranın 15'inde olgunlaşır ve Haziran ayının son haftasında hasat edilir. Meyveleri 3–4 gr ağırlığındadır. Reçel üretimi ve salamura olarak değerlendirilmektedir. Endüstri çeşidi olarak gittikçe öneminin artacağı tahmin edilmektedir. % 3 oranında meyve çatlaması yapar ve taşımaya dayanıklılığı azdır. Lambert, 0 900 Ziraat çeşitleri tarafından tozlanır. Bol ve geç çiçek açması nedeniyle birçok kiraz çeşidine tozlayıcı olarak kullanılmaktadır.

ŞEFTALİ ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ



ELAGANT LADY



MONREO



CALDESİ 2000

Kaliforniya'da ıslah edilen bu çeşidin ağaçları orta kuvvette, yarı dik gelişim gösterir ve standart meyveler oluşturur. Meyve orta büyülükte olup meyve kabuğu sarı zemin üzerine sıvama koyu parlak kırmızı- mor renktedir.

Meyve eti krem renginde, orta sulu, lezzetli, çekirdek ete bağlı değildir. Meyvenin dalda tutunması oldukça kuvvetli olup hasat gecikse bile meyve dökümü görülmez. Meyve et dokusunun sert olması nedeniyle nakliye çok uygundur. Son yıllarda ülkemizde yetiştiriciliği yaygınlaşmakta olan bu çeşit ABD' de en çok yetiştirilen çeşitler arasında yer almaktadır. Redhaven' den 22 gün sonra hasat edilir.

Ağaçları kuvvetli ve yayvan gelişir ve oldukça verimli geççi bir çeşittir. Meyve basık yuvarlak, oldukça iri, kabuk rengi sarı zemin üzerine sıvama kırmızı, meyve eti, sarı, gevrek, sert ve çekirdek etten ayrıdır. Bursa ve Çanakkale yöresinde Eylül'ün başında hasat edilirken, Isparta yöresinde Eylül'ün ortasında hasat edilir. Geççi bölgelerde dikilmesi gereken en önemli çeşittir

İtalya'da ıslah edilen, ağaçları orta kuvvette ve yarı dik gelişen oldukça verimli bir çeşittir. Meyve iri, albenisi iyi, meyve kabuğu sarı zemin üzerinde koyu kırmızı renkte, meyve eti beyaz olup çekirdek ete bağlı değildir. Big Top çeşidinden 10 gün önce hasat edilen bu çeşidin yetiştiriciliği özellikle Ege ve Güney Marmara Bölgelerinde yaygınlaşmaktadır. Verim yönünden GF 677 klon anacı üzerinde oldukça başarılıdır. Nektarin yetiştirilen tüm bölgelere önerilmektedir.



SWEET LADY

İtalya'da geliştirilen ağaçları kuvvetli gelişen oldukça yüksek verimli, yayvan taç oluşturan geççi bir çeşittir. Meyve kabuğu sarı zemin üzerine sıvama canlı kırmızı renktedir. Meyve eti sarı renkte, sert dokulu olup yaklaşık 1 ay kadar soğuk hava depolarında muhafaza edilebilir. Big Top çeşidinden 55 gün sonra olgunlaşır.



REDHEAVEN

Çok eski bir çeşit olmasına rağmen hala üretimi yapılmaktadır. Meyve kabuk rengi sarı zemin üzerine %70 kırmızı renklidir. Meyve çekici ve cezp edicidir. Meyve orta irilikte, meyve eti sarı, sert ve iyi aromaya sahip, çekirdek yarı ete bağlıdır. Meyve gözleri soğuğa dayanıklı olduğundan her yıl sürekli ürün verir. Meyveler aynı zamanda olgunlaşmadığından 4–5 kerede toplanmalıdır. Hasat zamanı Temmuz 20 de başlar Ağustos'un ilk haftasına kadar devam eder.

VİŞNE ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ




KÜTAHYA

Ülkemizde en fazla yetiştirilen vişne çeşidi olup aynı ad altında oldukça farklı tipleri mevcuttur. Ağaçları yarı dik taç oluşturur ve çok verimlidir. Meyve yuvarlak, çok iri, 5–6 gr ağırlığında, koyu morumsu kırmızı şarap renginde, et dokusu sert, çok sulu, az lifli ve meyve suyu kalitesi çok iyi olup çatlamaya dayanıklıdır.

ANAÇ VE BAĞ ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

41-B	41-B: % 40 kirece dayanıklı, erkincilik sağlar, gelişme kuvveti zayıf. Kuraklığa orta dayanıklıdır.
99-R	99 R : %17 Kirece dayanıklı, geççilik sağlar, derin verimli toprakları sever, çesidin verimine katkısı çoktur. Kuraklığa çok dayanıklıdır.
110-R	110 R : %17 Kirece dayanıklı, derin, kuru çakılı toprakları sever, geççilik sağlar, çesidin verimine katkısı çoktur. Kuraklığa dayanıklıdır.
140-RUG	140 RUG: Çok kuvvetli olan bir anaçtır. Bu anaç çok kuvvetli olduğundan üzerine aşılanan çesidin vegetatif devresini uzatmaktadır. % 20 aktif kirece ve filokseraya dayanıklı olmakla birlikte yapraklarında filoksera gallerinin olduğu görülebilir.



RAZAKİ

Sarı renkli, uzun elips ve çok iri daneli, verim 1250–1800 kg/dekar. En yaygın sofralık çeşitlerimizdendir. Uzun, beyaz 1–3 çekirdekli, az sulu, tatlı, kabuk kalın veya orta kalındır.




RED GLOBE

Pembemsi-Kırmızı renkli, yuvarlak hafif eliptik çok iri daneli, verim 2000–3500 kg/dekar. Dünyanın en iri daneli üzüm çeşidi(Olgunlaşma riski olabilir).



Kaliteli kurutmalık bir çeşittir. Yeşil-Sarı renkli, uzun ve yuvarlak tipleri vardır. Dane küçük, verim 1750–3500 kg/dekar.

SULTANI ÇEKİRDEKSİZ



Yeşil-Sarı renkli, hafif oval ve çok iri daneli, verim 1600–2500 kg/dekar.

ITALIA



Siyah renkli, yuvarlak orta iri daneli, şaraplık kalitesi yüksek, verim 1200-1300 kg/dekar.

KALECİK KARASI



Siyah renkli, yuvarlak orta iri daneli, şaraplık, orta verimli bir çeşittir.

BOĞAZKERE

BADEM ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ



FERRAGNES

Fransa'da ıslah edilen ve geç çiçek açması nedeniyle yetiştirciliği yaygınlaşan çeşitler arasında yer almaktadır. Ağaçları kuvvetli gelişir. Olgunlaşma zamanı Eylül ayının 2-3. haftalarıdır. Düzenli verim verir ve erken meyveye yatar. İç badem ağırlığı 1,4 gr. olup iç randımanı % 35-40, ikiz badem oranı % 3-5 oranındadır. Ferraduel, Ferrastar ve Teksas çeşitleri dölleyici olarak önerilebilir.



FERRADUEL

Geç çiçeklenen bir çeşittir. İkiz meyve yapmaz. İç randıman oranı % 35'tir. İç meyve ağırlığı 1,3 gr.dir. Tozlayıcısı Ferragnes çeşididir.



FERRASTAR

Fransa'da ıslah edilen ve geç çiçeklenen çeşitlerdendir. Ağaçları kuvvetli gelişir ve erken meyveye yatar. Randıman % 25–30 seviyelerinde olup ikiz meyve oluşturma oranı % 10'lardır civarındadır. Hasat dönemi orta geçtir. Dölleyicileri Ferragnes ve Ferraduel çeşitleridir.



NONPARIEL

Kaliforniya kökenli olup dünyada en fazla yetişirilen çeşittir. Ağaçları orta kuvvette gelişir, yayvan ve dağınık bir taç yapısına sahiptir. Düzenli ve bol ürün verir. Orta geç dönemde çiçek açar. Meyve randımanı % 55–65 civarında olup dış kabuk ikiz meyve oluşturma oranı % 5'ler seviyesindedir. Kabuk kahverengi-koyu kahverengi, iç badem uzun oval şekilli, orta iridir. Kendine verimsiz olup tozlayıcıları; Teksas, Ne Plus Ultra, Carmel çeşitleridir.



TEXAS

California grubu bademlerinden uzun yıllar boyunca üretimi yapılan çeşittir. Meyve orta irilikte, kabuğu orta sertliktedir. Ağaç dikine büyür. Verimliliği çok iyidir. İç badem kalitesi orta, iç randımanı %45–50. Tozlayıcıları; Marcona ve Nonpareil'dir.

CEVİZ ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ




BİLECİK

Dik, yayvan ve kuvvetli bir taç gelişmesi gösterir. Kıyı bölgeler hariç, tüm bölgelerde yetiştirilir. Özellikle geç donların görüldüğü yörelerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Meyve salkımı 2-3'lü oluşur. %30 yan dallarda meyve yapar. İnce kabuklu, içi dolgun, kabuktan kolay ayrıılır. Tane ağırlığı 13 gram, iç oranı %53, yağ oranı %68, protein oranı %18'dir. Kuru ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 6-7 kg'dır. Eylül ayı sonlarında hasat edilir. Tozlayıcıları; Şebin, Yalova-3 ve KR-2 (Y-1) çeşitleridir.



ŞEBİN

Sık dallı, yayvan bir taç gelişmesi gösterir. Kıyı bölgeleri hariç, ceviz yetişen tüm yörelerde yetişim. Özellikle geç donların görüldüğü yörelere tavsiye edilir. Kaliteli ve çok verimlidir. Meyve salkımı 2-4'lü olup %35 oranında yan dallarda meyve oluşur. Oval bir meyve yapısına sahiptir. İnce kabuklu, kabuktan kolay ayrıılır. İçi dolgun, tane ağırlığı 12 gram, iç oranı %63, yağ oranı %67, protein %17 olup, çiçekleri kendine verimlidir. 5 yaşındaki bir ağacın ortalama verimi 7-8 kg'dır. Eylül ayı sonlarında hasat edilir. Tozlayıcıları; Bilecik ve KR-2 (Y-1) çeşitleridir.



CHANDLER

Salkımda meyveler 1-4'lü olup kabuk ince, az pürüzlü, oval şekilli bir çeşittir. Meyve ağırlığı 13 gr, iç oranı % 49–52 'dir. Yağ oranı % 70, protein oranı % 23 olup kabuktan ayrılması kolaydır. İç ağırlığı 6,5–7 gr. Kuru ve taze ceviz olarak tüketilmeye elverişlidir. Aynı ekolojide Bilecik çeşidinden 1 hafta, Yalova-4 çeşidinden 3 hafta sonra çiçeklenir. Geçit kuşağına kadar olan bölgelerde ilkbahar donlarını atlatabilen bir çeşittir. Tomurcuklarda verim % 85-90'dır. Çok verimlidir. İç beyazlık oranı %90-100'dür. Orta kuvvette büyür, yarı dik gelişir, 8x8 m. dikime uygundur. Geç yapraklandığı için bakteriyel yanıklıkta etkilenmez. Tozlayıcısı Franquette'dir.



FRANQUETTE

Eski bir Fransız çeşididir. Çeşidin yan tomurcuklarda düşük oranda meyve vermesi, iri ağaçlı olması ve nispeten düşük verimli olması nedeniyle bu çeşit son yıllarda sınırlı olarak dikilmektedir. Franquette ilkbahar geç donlarının yaygın olarak gözlendiği ve yağmurların sık rastlandığı yerlerde kullanılır Chandler ve Hartley için tozlayıcı çeşit olarak seçilmiştir. Küçük meyveli olup iç ağırlığı 5,3 gr, iç oranı %46–47, iç rengi ise genellikle çok iyidir. Franquette ağaçları diken, çok kuvvetli gelişir.

ÇAMLIBAHÇE SERİSİ



	<i>Hor.</i>	<i>Der. (cm)</i>	<i>Tanımlama</i>
Ap	Ap	0-22	Koyu kahverengi (7.5YR 3/2, kuru), koyu kahverengi (7.5YR 3/3, nemli); siltli killi tınlı; orta orta granüler; kuru iken hafif sert, nemli iken gevşek, yaş iken yapışkan ve plastik; kireçsiz; taşlı, yaygın ince saçak kökler; belirli dalgalı sınır.
A2ss	A2ss	22-83	Koyu kahverengi (7.5YR 3/3, nemli); kil; kuvvetli orta yarı köşeli blok; nemli iken sıkı, yaş iken çok yapışkan ve çok plastik; kireçli; az taşlı, seyrek ince saçak kökler; belirgin kayma yüzeyleri; geçişli dalgalı sınır.
Ck	Ck	83-147	Koyu kahverengi (7.5YR 3/4, nemli); kil; masif; nemli iken sıkı, yaş iken çok yapışkan ve çok plastik; çok kireçli; az taşlı, çok seyrek ince saçak kökler; seyrek 3-10 cm çaplı çakıl ve taşlar, 0.5-1 cm çaplı yoğun kireç cepleri, çok zayıf kayma yüzeyleri.

Şekil 1. Çamlıbahçe serisi profili ve morfolojisi


CORUM SERİSİ



	<u>Hor.</u>	<u>Der. (cm)</u>	<u>Tanımlama</u>
Ap	Ap	0-31	Kahverengi (7.5YR 4/3, kuru), koyu kahverengi (7.5YR 3/3, nemli); killi tın; orta orta granüler; kuru iken hafif sert, nemli iken gevşek, yaş iken az yapışkan ve az plastik; çok kireçli; taşlı; seyrek ince saçak kökler; orta yoğun 1-5 cm çaplı çakıllar; belirli dalgalı sınır.
Bw	Bw	31-64	Koyu kahverengi (7.5YR 3/3, nemli); killi tın; orta orta prizmatik; nemli iken gevşek, yaş iken yapışkan ve plastik; çok kireçli; taşlı; seyrek ince saçak kökler; orta yoğun 1-3 cm çaplı çakıllar, yoğun kireç miselleri; belirli dalgalı sınır.
C1	C1	64-94	Koyu kahverengi (7.5YR 3/3, nemli); kil; masif; nemli iken gevşek, yaş iken yapışkan ve plastik; çok kireçli, az taşlı; seyrek 0.5-1 cm çaplı çakıllar; geçişli dalgalı sınır.
C2	C2	94-150	Koyu sarımsı kahverengi ve koyu kahverengi (10YR 3/4 - 7.5YR 3/3, nemli); killi tın; masif; nemli iken gevşek, yaş iken yapışkan ve plastik; çok kireçli; az taşlı.

Şekil 2. Corum serisi profili ve morfolojisi

İĞDELİK SERİSİ



	<u>Hor.</u>	<u>Der. (cm)</u>	<u>Tanımlama</u>
Ap	Ap	0-16	Sarımsı kahverengi (10YR 5/4, kuru), kahverengi (7.5YR 4/4, nemli); siltli killi tın; orta küçük granüler; kuru iken hafif sert, nemli iken gevşek, yaş iken az yapışkan ve plastik; çok kireçli; taşsız; yaygın ince saçak kökler; geçişli dalgalı sınır.
A2	A2	16-38	Koyu sarımsı kahverengi (10YR 4/4, kuru), kahverengi (7.5YR 4/4, nemli); killi tın, orta orta yarı köşeli blok; kuru iken hafif sert, nemli iken gevşek, yaş iken az yapışkan ve plastik; çok kireçli; taşsız; seyrek ince saçak kökler; geçişli dalgalı sınır.
C1	C1	38-77	Kahverengi (7.5YR 4/4, nemli); killi tın; masif; nemli iken gevşek; yaş iken az yapışkan ve plastik, çok kireçli; taşsız; çok seyrek ince saçak kökler; geçişli dalgalı sınır.
C2	C2	77-120	Kahverengi (7.5YR 4/4, nemli); killi tın; masif; nemli iken sıkı; yaş iken yapışkan ve plastik; çok kireçli; taşsız.


Şekil 3. İğdelik serisi profili ve morfolojisi

KOÇGÖZ SERİSİ

	<i>Hor.</i>	<i>Der. (cm)</i>	<i>Tanımlama</i>
Ap	Ap	0-20	Kahverengi (10YR 4/3, kuru), koyu kahverengi (10YR 3/3, nemli); killi tın; orta küçük granüler; kuru iken hafif sert, nemli iken gevşek, yaş iken yapışkan ve plastik; kireçsiz; az taşlı; seyrek ince saçak kökler; geçişli dalgalı sınır.
A2	A2	20-41	Koyu kahverengi (10YR 3/3, nemli); killi tın; orta orta yarı köşeli blok; nemli iken gevşek, yaş iken yapışkan ve plastik; kireçsiz; az taşlı; seyrek ince saçak kökler; belirli dalgalı sınır.
CA	CA	41-58	Kahverengi (10YR 4/3, nemli); tınlı kum; masif; kuru iken hafif sert, nemli iken dağılıgan, yaş iken yapışkan değil ve plastik değil; kireçsiz; taşlı; orta yoğun 2-10 cm çaplı çakıl ve taşlar; kesin dalgalı sınır.
C	C	58-125	Kireçsiz; çok taşlı; değişik orijinli çok yoğun 2-15 cm çaplı çakıl ve taş katmanı.



Şekil 4. Koçgöz serisi profili ve morfolojisi



	<u>Hor.</u>	<u>Der. (cm)</u>	<u>Tanımlama</u>
	Ap	0-19	Sarımsı kahverengi (10YR 5/4, kuru), kahverengi (7.5YR 4/4, nemli); killi tın; kuvvetli orta granüler; kuru iken sert, nemli iken gevşek, yaş iken az yapışkan ve plastik; çok kireçli; az taşlı; seyrek ince saçak kökler; seyrek 1-3 cm çaplı çakıllar; geçişli dalgalı sınır.
	A2	19-37	Kahverengi (7.5YR 4/4, nemli); siltli kil; orta orta yarı köşeli blok; nemli iken gevşek, yaş iken yapışkan ve plastik; çok kireçli; az taşlı; seyrek ince saçak kökler; 1-3 cm çaplı seyrek çakıllar; geçişli dalgalı sınır.
	A3	37-68	Koyu kahverengi (7.5YR 3/4, nemli); killi tın; orta küçük yarı köşeli blok; nemli iken gevşek, yaş iken çok yapışkan ve çok plastik, çok kireçli; taşlı; seyrek ince saçak kökler; orta yoğun 2-7 cm çaplı yuvarlaklaşmış çakıllar; geçişli dalgalı sınır.
	C	68-108	Kahverengi (7.5YR 4/4, nemli); siltli kil; masif; ; nemli iken gevşek, yaş iken yapışkan ve plastik; çok kireçli; çok taşlı; değişik orijinli çok yoğun 5-10 cm çaplı yuvarlak çakıllar ve taşlar.

Şekil 5. Kovanlık serisi profili ve morfolojisi.

KURTLAR SERİSİ



Hor. Der. (cm)

Tanımlama

Ap	0-35	Kahverengi (7.5YR 4/3, kuru), koyu kahverengi (7.5YR 3/3, nemli); killi tın; orta orta granüler; kuru iken hafif sert, nemli iken gevşek, yaş iken yapışkan ve plastik; kireçsiz; taşlı; seyrek orta saçak kökler; orta yoğun 2-10 cm çaplı çakıl ve taşlar; belirli dalgalı sınır.
Bw	35-88	Koyu kahverengi (7.5YR 3/3, nemli); kil; kuvvetli kaba yarı köşeli blok; nemli iken gevşek, yaş iken çok yapışkan ve çok plastik; kireçsiz; az taşlı; seyrek ince saçak kökler; geçişli dalgalı sınır.
BC	88-110	Koyu kahverengi (7.5YR 3/3, nemli); siltli kil; masif; nemli iken gevşek, yaş iken yapışkan ve plastik; az kireçli, az taşlı; çok seyrek ince saçak kökler; geçişli dalgalı sınır.
C	110-130	Koyu kahverengi (7.5YR 3/4, nemli); siltli killi tın; masif; nemli iken gevşek, yaş iken az yapışkan ve plastik; kireçli; taşlı, orta yoğun 3-5 cm çaplı çakıllar.

Şekil 6. Kurtlar serisi profili ve morfolojisi

SIRÇALIK SERİSİ

Ap



Bw1

Bw2

C

Hor. Der. (cm)

Tanımlama

Ap	0-26	Kahverengi (7.5YR 4/4, kuru), koyu kahverengi (7.5YR 3/3, nemli); killi tın; orta orta granüler; kuru iken sert, nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan ve plastik; az kireçli; çok taşlı; yaygın ince saçak kökler; yoğun 3-5 cm çaplı çakıllar; belirli dalgalı sınır.
Bw1	26-55	Koyu kahverengi (7.5YR 3/3, nemli); kil; kuvvetli orta köşeli blok; nemli iken sıkı, yaş iken çok yapışkan ve çok plastik; az kireçli; taşlı; yaygın ince saçak kökler; orta yoğun 3-5 cm çaplı çakıllar; geçişli dalgalı sınır.
Bw2	55-102	Çok koyu kahverengi (7.5YR 2.5/3, nemli); kil; kuvvetli kaba köşeli blok; nemli iken sıkı, yaş iken çok yapışkan ve çok plastik; az kireçli; az taşlı; çok seyrek ince saçak kökler; seyrek 5-15 cm çaplı çakıllar ve taşlar; belirli dalgalı sınır.
C	102-130	Koyu kahverengi (7.5YR 3/3, nemli); kil; masif; nemli iken sıkı, yaş iken çok yapışkan ve çok plastik; az kireçli; az taşlı; çok seyrek çok ince saçak kökler.

Şekil 4.2. Sırçalık serisi profili ve morfolojisi