

MÜCADELESİ:

Kültürel Önlemler:

Enfekteli sürgünler dipten kesilip uzaklaştırılmalıdır. Asmaların altı temiz tutulmalıdır. Gereğinden fazla sulanmamalıdır. Hastalıktan korunmak için budama ve koltuk alma işleri zamanında iyi bir şekilde yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele:

Bağ mildiyözü mücadelesinde Tahmin Uyarı Sisteminin uygulandığı yörelerde.

İlaçlama: Kışlık Sporlarla tahmini bulaşmadan sonra ve yazlık sporların ortaya çıkmasından önce yapılacaktır. Oosporların çimlenmesi, bunlarla bulaşması şu koşulların bir araya gelmesi ile gerçekleşmektedir.

1. Sürgünler 5–6 cm boya ulaşmış olmalıdır.

2. Asmaların altındaki toprak nemi en az %70 oranına ulaşmış ve bu nem seviyesi ortalama sıcaklıklara göre aşağıdaki cetvelde belirtilen süre korunmuş olmalıdır.

Günlük Ortalama Hava Sıcaklığı%70 Nem ve Bunun Üzerindeki Toprak Nemliliği Süresi (Kesintisiz Olarak)	%70 Nem ve Bunun Üzerindeki Toprak Nemliliği Süresi (Kesintisiz Olarak)
11-13 °C	7-8 Gün
14-16 °C	4-5 Gün
17 °C	2-3 Gün

3. Asmanın duyarlı organlara üzerinde yağmur ve çiğ nedeniyle en az 2 saat süreyle ıslaklık bulunmalıdır.

İLAÇLAMALARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- İlaç seçiminde mutlaka uzman kuruluşlardan yardım alınmalıdır.
- İlaç etiketleri çok iyi okunmalıdır.
- Önerilen doza mutlaka uyulmalıdır.
- Etiketlerde yazılı kültür bitkisinden başka bir bitkiye kesinlikle kullanılmamalıdır.
- İlaçlamalar günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
- İlaçlamalarda mutlaka eldiven, maske, koruyucu elbise giyilmelidir.
- Uygun alet ve ekipman seçilmelidir.
- İlaçlama esnasında hiçbir şey yenip içilmemelidir.
- İlaç etiketi üzerinde yazılı son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye mutlaka uyulmalıdır.

Daha Geniş Bilgi için

İl ve İlçe Müdürlüklerimize Başvurunuz.



0 258 212 54 80 (4 Hat)



0 258 212 54 87



<https://denizli.tarimorman.gov.tr>



DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

**BAĞLARDA
MİLDİYÖ HASTALIĞI**



DENİZLİ

*Ürününüz Bol,
Kazancınız Bereketli Olsun...*

BAĞ MİLDİYÖSÜ
(*Plasmopara viticola*)
(Berk.et.Curt.) Berl er de Toni)

TANIMI:

İlkbaharın sıcak ve yağışlı geçtiği yıllarda zararını artıran salgın yaptığı yıllarda bağların kuvvetini düşüren ve dolayısıyla mahsulün az olmasına neden olan önemli bir hastalıktır.

Fungus kışı yere düşen enfekteli yapraklarda oluşan oospor halinde geçirir. İlkbaharda oosporlardan oluşan zoosporlar sıçrayan yağmur damlalarıyla etrafa dağılır.

Yapraklara ulaştığında su damlası içinde çimlenip sadece yaprak altındaki doğal gözeneklerden (stomalardan) giriş yapar. Bu nedenle enfeksiyonun büyük bir kısmı yaprağın alt yüzeyindedir.



Hastalık, asmanın tüm yeşil kısımlarında görülebilir. Henüz 25 cm iken hastalık görülmeye başlar. Yaprakların üst yüzeyinde tipik yağ lekeleri meydana gelir. Alt yüzeylerinde ise beyaz bir misel örtüsü vardır. Bu yağ lekesi görülen kısımlar sarımtırak renktedir, lekeler büyüdükçe ortaları kızarır ve dökülür



Sürgünler üzerinde eliptik lekeler meydana gelir. Hastalık şiddetli ise sürgünler kurur. Çiçekler adeta fungusla örtülür. Kısa zamanda kahverengiye dönüşüp kuruyup dökülür. Daneler ise grimsi bir renk alırlar. Hastalığa yakalanan daneler buruşur ve meşinimsi bir hal alırlar.

Daneler olgunlaştıklarında daha az duyarlıdırlar. Enfekteli daneler beyaz çeşitlerde mat grimsi yeşil, siyah çeşitlerde pembemsi kırmızıya dönerler.

