

MÜCADELESİ:

Kültürel Önlemler:

Asmalarda budamalar zamanında yapılmalı, hasta sürgünler dipten kesilmelidir. Budama artıkları kesinlikle bağdan uzaklaştırılıp yakılmalıdır. Budamada temiz aletler kullanılmalıdır.

Kimyasal Mücadele:

İlaçlama zamanları

Kış İlaçlaması:

Budamadan sonra gözler uyanmadan 15-20 gün önce yapılmalıdır.

Yaz İlaçlaması:

1. **İlaçlama:** sürgünler 2–3 cm,
2. **İlaçlama:** sürgünler 8–10 cm,
3. **İlaçlama:** sürgünler 25–30 cm, bulduğu devrede yapılmalıdır.

Kimyasal mücadele konusunda daha geniş bilgi almak için İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurunuz.

İLAÇLAMALARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- İlaç seçiminde mutlaka uzman kuruluşlardan yardım alınmalıdır.
- İlaç etiketleri çok iyi okunmalıdır.
- Önerilen doza mutlaka uyulmalıdır.
- Etiketlerde yazılı kültür bitkisinden başka bir bitkiye kesinlikle kullanılmamalıdır.
- İlaçlamalar günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
- İlaçlamalarda mutlaka eldiven, maske, koruyucu elbise giyilmelidir.
- Uygun alet ve ekipman seçilmelidir.
- İlaçlama esnasında hiçbir şey yenip içilmemelidir.
- İlaç etiketi üzerinde yazılı son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye mutlaka uyulmalıdır.

Daha Geniş Bilgi için
İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvurunuz.

 **0 258 212 54 80** (4 Hat)

 **0 258 212 54 87**

 <https://denizli.tarimorman.gov.tr>



DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

**BAĞLARDA
ÖLÜKOL HASTALIĞI**



DENİZLİ

*Ürününüz Bol,
Kazancınız Bereketli Olsun...*

BAĞLARDA ÖLÜKOL (*Phomopsis viticola* (Sacc) Sacc)

Fungus bir yara parazitidir. Kışı dallar üzerinde piknitler halinde ve sürgünün enfekte olmuş dip gözleri içinde misel halinde geçirir. Doku içerisindeki misel sonbahar ve kış aylarında aktif haldedir. İlkbaharda yağışlar, fazla rutubet, yoğun sis, çığ ve kırağı ile ıslanan olgun piknitlerden sporlar dışarı çıkar.



Fungusun enfeksiyon yapabilmesi için mutlaka rutubete ihtiyacı vardır. Eniyi geliştiği sıcaklık 23 °C'dir. %100 nisbi nemde birkaç saat içinde enfeksiyon yapabilir. Fungus genellikle kurak ve sıcak yaz aylarında enfeksiyon yapmaz. Sürgünler 3–10 cm uzunluktaki devrede enfeksiyonlara çok duyarlıdır.

Başta sürgünler olmak üzere yapraklar, yaprak sapları, salkım ve salkım sapları, daneler hastalığa yakalanabilir. Ülkemizde hastalık daha çok sürgünlerde kendini göstermektedir. Sürgünün dipten itibaren 3. veya 5. gözüne kadar olan kısımda lekeler ve çatlamlar görülür.



Önce ortaları koyu siyah lekeler meydana gelir daha sonra bu lekeler birleşir gayri muntazam siyah renkli, çatlak ve yaraları oluşturur. Yaralar çok derin olup odun dokusunu dahi çatlatabilir.



Hastalanmış salkım ve dane saplarında lekeler oluşabilir. Çatlayan, uzunluğuna yarılan sürgünler sonbaharda beyazlaşarak hastalığın tipik şeklini alır.

