

Gübreleme

Biber aynı yere 3-4 yılda bir dikilmelidir. Biber, topraktaki organik maddeden hoşlanır. Dekara 3-5 ton yanmış ahır gübresinin tarla hazırlığı sırasında toprağa karıştırılması gerekir. Ayrıca dekara 25-30 kg azot, 8-15 kg fosfor, 25-30 kg potasyum ve 10-12 kg kalsiyum verilmelidir. Azotun %50'si dikim öncesi toprak işlemede, %25'i ara çapada, geri kalan %25'i de çiçeklenmeden önce, fosforun tamamı dikim öncesi toprak işlemede, potasyumun %60-65'i dikim öncesi toprak işlemede, geri kalan %35-40'ı ise çiçeklenme öncesinde toprağa verilmelidir. Kalsiyum azotlu gübre formunda verilmelidir.



Toprağımı tahlil ettirdim.

Keşke ben de ettirseydim.

En doğru gübreleme; toprak analizi yaptırdıktan sonra hazırlanan gübreleme programına göre yapmaktır.

DEĞERLİ ÜRETİCİLERİMİZ

Tarlalarınızı sürekli olarak kontrol ediniz.

İl Müdürlükleri tavsiyelerine uygun olarak hareket ediniz.

En etkili mücadele, teknik tavsiyelere uymakla mümkündür.



DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

AÇIKTA BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ

Daha Geniş Bilgi için
İl ve İlçe Müdürlüklerimize Başvurunuz.



0 258 212 54 80 (4 Hat)



0 258 212 54 87



<https://denizli.tarim.gov.tr>



denizli@gthb.gov.tr

Ürününüz Bol,
Kazancınız Bereketli Olsun...



BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ

Ülkemizin her bölgesinde yetiştiriciliği yapılan biber; taze tüketimin yanında, toz biber, salça, közleme, sos, turşu ve ana yemeklerin içerisinde çok değişik şekillerde değerlendirilmektedir. Ayrıca ilaç yapımında ve ülkemizde pastırma yapımında toz biber kullanılmaktadır.



İklim

Biber ılık ve sıcak iklim sebzesidir. En uygun yetiştirme sıcaklığı 20-30°C'dir. 8°C'nin altında çiçek tomurcukları oluşamaz. 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda ölüm meydana gelir. 35°C'nin üstündeki sıcaklıklarda bitki gelişmesi ve büyümesi çok yavaşlar, meyve bağlama ve olgunlaşma olumsuz etkilenir, meyvelerde acılaşma başlar.

Gece sıcaklığı nispeten düşük olduğu zaman, biberler, dölllenme olmadan yani partenokarpik meyveler meydana getirmektedir

Düşük ışık yoğunluğunda da çiçek tomurcukları oluşamaz, verim düşer.

Toprak

Biber derin, geçirgen, su tutma özelliği iyi, besin ve organik maddece zengin bahçe toprağı denilen tınlı topraklarında iyi yetişir. Kökler narin yapıda olduklarından ağır killi, havasız ve su tutan topraklarda iyi bir yetiştiricilik yapılamaz. Toprak pH'sının 6.0-6.5 olmasını ister.



Fidelerin Dikimi ve Sulama

Don tehlikesi tamamen kalktıktan ve sıcaklık 15°C civarında olduğu zaman dikime başlanır. Fideler kök bölgesi seviyesine kadar toprağı dikilmelidir.

DİKİM ŞEKİLLERİ



DOĞRU




YANLIŞ



YANLIŞ

Derin dikimler birçok hastalığın daha ilk dikimde bitkilere zarar vermesine neden olmaktadır

Biberde kök boğazı yanıklığı hastalığı riskine karşı karık usulü yetiştiricilik yapılmalı ve fideler karık sırtına dikilmelidir. Böylece kök boğazına su temas ettirilmeden sulama yapılması sağlanmalıdır. Damlama sulama ise en uygun yöntemdir.



Biberde su noksanlığı çiçek ve küçük meyvelerin dökülmesine, su fazlalılığı ise yaprak dökümüne neden olur. Bu nedenle yeterli ve dengeli sulama yapılmalı, özellikle ilk meyveler görülünceye kadar fazla su verilmemelidir.



Ekili Arazide Yapılacak Bakım İşleri

Dikimden yaklaşık 20 gün sonra birinci, bundan 3-4 hafta sonra ikinci, bundan 3 hafta sonra da üçüncü çapa yapılır.