

larva 50-60 mm boyunda, açık sarı renkli ve üzerinde lacivert noktacıklar vardır.



Ağaç sarı kurdu daha çok yaşlı, bakımsız, kıraç ve taban suyu yüksek bahçelerde sorun olmaktadır.

Larvalar, ağaçların odun kısmında beslenerek gövde ve dallarda galeriler açmak suretiyle zarar yapar. Beslenme sırasında iletim demetlerinin tahrip edilmesi, zarar görmüş bitki organlarının veya ağacın tamamen ölümüne neden olabilir. Larvaların giriş yaptığı deliklerden, yoğun bitki özsuyu akışı olur.



MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler:

1. Budama sırasında veya mevsim boyunca yapılan kontrollerde, bulaşık dallar kesilerek imha edilmelidir.
2. Düşük yoğunluklarda, larva giriş deliklerine sokulacak uygun kalınlıkta bir tel ile larvalar öldürülmelidir.

Kimyasal Mücadele:

Zararın söz konusu olduğu bahçelerde haziran sonlarından başlanarak ilacın etki süresine göre 3-4 ilaçlama yapılmalıdır.

NAR YAPRAK BİTİ (Aphis punicae)

Nar yaprakbitinin yaklaşık 1,5-3 mm boyunda, vücut yeşil veya sarımsı yeşil renktedir. Yaprak altında, sürgün uçlarında, çiçek ve meyveler üzerinde yerleşerek gruplar halinde bulunur. Daha çok sık dikim yapılmış, düzenli budama yapılmayan, nem oranı yüksek, yoğun ilaçlamaların yapıldığı bahçelerde sorun oluşturmaktadır.

Nar yaprakbiti, bitki öz suyunu emerek beslenmekte ve bu sırada salgıladığı tatlımsı sıvı madde ile fumajine (siyah küf tabakası) neden olmaktadır. Yoğun fumajine bağlı olarak bitki gelişimi zayıflamakta ayrıca, ürünün kalitesini ve pazar değerini düşürmektedir.



Daha Geniş Bilgi için

İl ve İlçe Müdürlüklerimize Başvurunuz.

☎ 0 258 212 54 80 (4 Hat)

☎ 0 258 212 54 87

🌐 <https://denizli.tarimorman.gov.tr>



DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

NAR ZARARLILARI



Ürününüz Bol,
Kazancınız Bereketli Olsun...

HARNUP GÜVESİ

(*Ectomyelois ceratoniae*)

Harnup güvesi gri renkli olup, genel görünüşü küf renginde olup, kanatları üzerinde “W” şeklinde desen bulunmaktadır.

Olgun larva boyu 15-18 mm yi bulur olup vücut pembemsi ,baş kahverengidir.



Polifag bir zararlıdır. Yumurtalarını genellikle temmuz ayından itibaren ben düşme dönemindeki narlara bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar, önce narın meyve tacında ve özellikle de stamenlerin kalikse bağlandığı yerlerde beslenir.

Beslenme sonucu zarar görmüş narların dış kabuğunda, önce benek şeklinde kahverengileşme görülür. Bu leke büyüyerek kabukta çökme, çatlama ve meyvede tamamen çürüme olur.

MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler:

1.Nar bahçesi içinde veya çevresinde, zararlının diğer konukçuları yetiştirilmemelidir.

2.Hasada kadar haftalık kontrollerle yere dökülen bulaşık meyvelerin toplanarak imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele:

Bu zararlıya karşı mücadelede en uygun zaman, yumurta açılımının saptandığı ve larvanın henüz meyveye girmeden önceki dönemdir.


Bu amaçla nar meyveleri yaklaşık 3-5 cm çapa ulaştığında (haziran sonu-temmuz başı) kontroller yapılır ve bulaşıklık %5 'in üzerinde ise ilaçlama yapılır.

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ

(*Ceratitis capitata*)

Erginleri ortalama 5 mm boyunda ve genellikle ev sineklerinin 2/3 ' ü kadardır. Dişilerin abdomeninin ucunda yumurta bırakmaya yarayan ovipozitör bulunur.

Larva, kirli beyaz renkli ve bacaksızdır. Pupa koyu kahverenginde olup, fıçı şeklindedir.



Polifag bir zararlı olup, larvası nar meyvelerini kurtlandırarak çürümeye neden olmaktadır. Yumurtalarını genellikle, temmuz ayından itibaren ben düşme dönemindeki narların kabuğu altına bırakır.

Yumurtadan çıkan larvalar, nar meyvesinin etli kısmında beslenerek dış kabukta bir siyahlaşma, yumuşama ve çöküntü meydana getirir. Bu şekilde zarar görmüş narlar, zamanından önce olgunlaşıp dökülerek çürümektedir.



MÜCADELESİ

Kültürel Önlemler:

1.Nar bahçesi içinde veya çevresinde, zararlının diğer konukçuları yetiştirilmemelidir.

2. Hasat öncesi ve sonrası yere dökülmüş ve ağaç üzerinde kalmış narlar toplanarak imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele:

Bu zararlı ile mücadelede en uygun zaman, narlara tatlı suyun yürüdüğü veya renklenmenin başladığı ben düşme dönemidir. Bu amaçla, bahçedeki en erkenci çeşitler esas alınır ve meyvelerde vuruk kontrolü yapılarak, ergin çıkışları gözlenir.

Kontroller sırasında meyvede vuruk saptandığında veya tuzaklarda ilk sinek yakalandığında, narlar da ben düşme döneminde ise hemen ilaçlamaya başlanır. Eğer sinek yakalanması devam ediyorsa, ilacın etki süresine göre (7-10 gün) hasada 10 gün kalana kadar ilaçlamaya devam edilir.

İlaçlamalarda, zehirli yem kısmi dal yöntemi kullanılır.

AĞAÇ SARI KURDU (*Zeuzera pyrina*)

Erginleri iri yapılı, kanatlar beyaz renkli ve üzerlerinde lacivert benekler bulunur. Olgun