

MÜCADELESİ:

Kültürel Önlemler:

Hastalığın görüldüğü bahçelerde ağaçlar üzerindeki tüm kuru dallar budanıp yakılmalı, mumyalaşarak ağaç üzerinde kalmış ve yere düşmüş meyveler toplanarak imha edilmelidir.

Kimyasal Mücadele:

1. **İlaçlama:** %5–10 çiçek açtığı dönemde
2. **İlaçlama:** %90–100 çiçek açtığı dönemde yapılmalıdır.

Kimyasal mücadele konusunda daha geniş bilgi almak için İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurunuz.

İLAÇLAMALARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- İlaç seçiminde mutlaka uzman kuruluşlardan yardım alınmalıdır.
- İlaç etiketleri çok iyi okunmalıdır.
- Önerilen doza mutlaka uyulmalıdır.
- Etiketlerde yazılı kültür bitkisinden başka bir bitkiye kesinlikle kullanılmamalıdır.
- İlaçlamalar günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
- İlaçlamalarda mutlaka eldiven, maske, koruyucu elbise giyilmelidir.
- Uygun alet ve ekipman seçilmelidir.
- İlaçlama esnasında hiçbir şey yenip içilmemelidir.
- İlaç etiketi üzerinde yazılı son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye mutlaka uyulmalıdır.

DEĞERLİ ÜRETİCİLERİMİZ



Tarlalarınızı sürekli olarak kontrol ediniz.

İl Müdürlükleri tavsiyelerine uygun olarak hareket ediniz.

En etkili mücadele, teknik tavsiyelere uymakla mümkündür.



DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA MONİLYA



Daha Geniş Bilgi için
İl ve İlçe Müdürlüklerimize Başvurunuz.

 **0 258 212 54 80** (4 Hat)

 **0 258 212 54 87**

 <https://denizli.tarimorman.gov.tr>

Ürününüz Bol,
Kazancınız Bereketli Olsun...


SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA MONİLYA

(*Sclerotinia laxa* Aderh et Ruhl.)

(*Sclerotinia fructigena*)

Hastalık etmeni olan fungus kışı hastalıklı meyveler ve dallar üzerinde misel halinde geçirir. Hastalanmış dal ve meyveler üzerinde ilkbaharda konidiler meydana gelerek açmış olan çiçekleri enfekte eder.

Hastalık konukçusunun çiçek, çiçek sapı, meyve ve sürgünlerinde belirti oluşturur. Hastalığa yakalanmış çiçeklerin petal yaprakları, dişi borusu ve erkek organları kahverengileşir ve bu renk değişimi daha sonra tüm çiçeğe yayılır. Hasta çiçekler dal üzerinde kurur ve mumyalaşır.



Meyve enfeksiyonları genellikle meyve olgunlaşmasına yakın dönemde meydana gelir. İlk belirti meyve kabuğunda oluşan kahverengi bir veya birkaç lekedir. Lekelerin etraflarında açık kahverengi bir halka bulunur. Çürüklük meyve etinin içine doğru gelişir, ancak leke çukurlaşmaz.

Meyve üzerindeki misel kütlesi zamanla meyveyi buruşturur ve tamamen kurutur. Kuruyan meyveler mumyalaşır ve dalda asılı kalırlar.



Çiçek sapından enfekte olan sürgünler esmerleşir, ince sürgünler tamamen kurur, kalınlarında ise kanser yaraları oluşur. Kanser yaraları kapanmaz, ortası çökük, elips şeklinde yâda uzun yarıklar şeklinde kendini gösterir.

Kanser yaralarının altındaki parankima dokusu erir ve kahverengine döner. Kuruyan kısımlardaki tomurcuk, çiçek, meyve ve yapraklarda ölümler ve dala asılı halde kalırlar. Yağmurlu ve nemli havalarda yara etrafında zamklanma görülür. Çok yağışlı dönemlerde zarar %80-90 olabilmektedir.

