

8-Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde Nasıl Korunmalıdır?

Hayvanlarda kene mücadelesi yapılmalıdır.

Hayvan barınakları kenelere karşı ilaçlanmalı,barınakların duvarları sıvanmalı ve badanaları yapılarak kenelerin buralarda yaşamaları engellenmelidir.

Hayvanların ve insanların kanlarına veya diğer vücut sıvılarına eldivensiz temas edilmemelidir. Hayvan barınaklarına girdikten veya hayvanlarla temastan sonra, vücut kene yönünden muayene edilmeli, kene varsa uzaklaştırılmalıdır.


Çalı Çırpı su kenarı veya gür otların bulunduğu alanlara piknik veya başka bir amaçla gidilmesi gerektiğinde pantolon paçaları çorap içine alınmalı ve dönüşte mutlaka vücut kene yönünden kontrol edilmeli kene varsa uygun bir şekilde uzaklaştırılmalıdır. Bu tür yerlere gidildiğinde mümkünse çizme giyilmelidir.

Keneler vücuttan uzaklaştırılırken kopartılmamalı bir cımbızla kenenin vücuda yapıştığı kısımdan tutulup çivi çıkarır gibi sağa sola oynatılarak çıkarılmalıdır.



Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır.kişilere uygulanmaktadır.

Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla,kenelerin üzerine sigara basmak veya kolonya ve gazyağı dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır. Bu uygulamalar,kenelerin kusmasına sebep olabileceğinden,kusmuktaki virüsler,kenenin kan emmek için ısırıldığı yerden vücuda girebilirler.



Kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek kişiler, repellent olarak bilinen böceksavar ilaçları vücutlarına sürerek veya elbiselerine emdirerek kullanabilirler.

Hasta olan kişilerin kullandığı malzemeler ve tuvaletler çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.

**Ayrıntılı Bilgi İçin
İl ve İlçe Müdürlüklerine Başvurunuz**

 **0 258 212 54 80** (4 Hat)

 **0 258 212 54 87**

 <https://denizli.tarimorman.gov.tr/>

 denizli@tarimorman.gov.tr



DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

**KIRIM-KONGO
KANAMALI ATEŞİ**



1-Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedir?

Kırım Kongo Kanamalı ateşi,ilk olarak hastalığın ismini aldığı Kırım ve Kongo'da görülen,virüs denilen mikropların sebep olduğu ölümcül seyrebilen bir hastalıktır.

2-Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Nasıl Bulaşır ?

Hastalık insanlara kenelerin ısırması veya kenelerle temas sonucu bulaşır.Evcil hayvanlarda kenelerin ısırması sonucu bulaşabilmektedir. Hastalık, hayvanlarda belirtisiz seyrederken insanlarda öldürücü olabilmektedir.

Yabani kemirici hayvanlar,kuşlar ve keneler hastalığın doğadaki devamlılığını sağlayan canlılardır.Keneler beslenmek için bu hayvanlardan kan emerler;kan emme sırasında aldıkları virüsü vücutlarında çoğaltırlar ve insanlardan kan emerken bulaştırırlar.

Hastalık kene ısırmasının yanı sıra,vücudunda virüs bulunan hayvanların kanlarına,vücut sıvılarına veya diğer dokularına temas etmekle bulaşabildiği gibi,bu hastalığa yakalanmış insanların kan veya vücut sıvılarına temas sonucu da bulaşma olabilmektedir.



3-Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinin Belirtileri Nelerdir?

Hastalık ateş,ani başlayan baş ağrısı,kas ağrısı,kırıklık,halsizlik ve belirgin iştahsızlık ile başlar;bulantı,kusma,karın ağrısı ve ishal gibi şikayetler de görülebilir.

İlk günlerde,yüzde ve göğüste kızarmalar ile gözlerde kanlanmalar ortaya çıkabilir. Göğüs ve karından başlamak üzere vücuda yayılan küçük nokta şeklinde kanamalar olabilir ve bu kanamalar büyüyerek vücuda yayılabilir.burun ve dişeti kanamaları gibi vücudun değişik yerlerinde kanamalar da olabilir.



4-Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden Nasıl Kuşulanılır?

Yukarıdaki belirtilerin bulunduğu kişilerin son iki hafta içinde;

Kene ısırması veya kene ile temas hikâyesi varsa,

Çalı çırpı su kenarları veya gür otların bulunduğu alanlarda piknik amaçlı veya diğer bir sebeple gitmeleri söz konusu ise,

Hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya diğer dokularına temasları var ise, Bu hastalığa yakalanmış kişilerin kan ve vücut sıvılarını bir temasları olmuş ise Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden şüphe edilmeli ve vakit geçirmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

5-Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Virüs alındıktan sonra ne zaman ortaya çıkar ve ne zaman görülür?

Kene tarafından ısırılma veya kene ile temas sonucu virüsün alınmasını müteakiben hastalığın belirtileri genellikle 1-3 günde ortaya çıkar;bu süre en fazla 9 gün olabilmektedir.Hasta insan veya hayvanlara ait kan vücut sıvıları veya diğer dokularla doğrudan temas sonucu meydana gelen bulaşmalarda hastalığın belirtilerinin ortaya çıkma süresi 5-6 gündür.Bu süre en fazla 13 gün kadar olabilmektedir.

Hastalık, çoğunlukla bulaştırıcı kenelerin aktif olduğu bahar ve yaz aylarında ortaya çıkabilmektedir.

6-Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Nerelerde Görülmektedir?

Hastalık sıklıkla Afrika,Asya,Ortadoğu ve Doğu Avrupa'da görülmektedir.Son yıllarda Kosova,Arnavutluk,İran,Pakistan,Afganistan ve Güney Afrika'da tek tek vakalar ve salgınlar şeklinde ortaya çıktığı bildirilmiştir.

Ülkemizin coğrafik yapısı ve iklimi kenelerin yaşamaları için uygun bir yapıya sahiptir.Bu sebeple hastalık özellikle hayvancılığın yapıldığı;nemin çalı ve çırpılı alanlar ile gür otlakların bulunduğu yerler başta olmak üzere,ülkemizin her yerinde görülebilir.

7-Kırım-Kongo kanamalı Ateşinin Tedavisi Var mıdır?

Yukarıdaki belirtilerin görülmesi ve hastalıktan kuşkulandıracak bir durumun bulunması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulursa,hastalığın teşhis ve tedavisi için gerekenler yapılabilmektedir.