

KIZGINLIK BELİRTİLERİ NELERDİR

- Diğer ineklerin üzerine atlamak ister ve atlar.
- Diğer ineklerin kendi üzerine atlamasına izin verir.
- Sık sık bağıırır, huzursuz ve sinirlidir.
- Ahırda diğer inekler yatarken kızgınlık gösteren inek ayakta durur, yatmaz.
- Vulvası şiş, kızarık ve nemlidir.
- Vulvasından yumurta akı kıvamında (cara)beyaz bir akıntı gelir.
- Süt verimi aniden düşer.
- Belinin kendiliğinden çökmesi gibi davranışlar gösterir.
- Kızgınlık başlangıcından, iki gün sonra kızgınlık sonuna doğru ineğin arkasından kanlı bir akıntı gelir.

Siyah Alaca Holstein, Jersey, Simental ve Montofon ırkı sığırlarda tohumlama tarihinde dört yaşına kadar olan (1440 gün) hayvanlar kendi ırkı ile, bunun dışındakiler ise kendi ırkı veya başka ırkın sperması ile tohumlanabilecektir. Bu hükme uyulmadığının tespiti halinde uygulayıcının suni tohumlama izni ve sözleşmesi iptal edilir..

**Yerli
GENTÜRK**

**Sperması Kullan
50 TL Fazla
Buzacağı Desteği Al**

Hayvan sahipleri, alınan ve satılan hayvanlarınızı 7 gün içerisinde, doğum, ölüm ve zorunlu kesim bilgilerini 30 gün içerisinde bildirmekle yükümlüdürler. Bu süre içerisinde bildirimde bulunmayan işletmelere idari para cezası uygulanacaktır.

Desteklemelerden yararlanmak ve cezai işlemlere maruz kalmamak için İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurarak işletmenizin Türkvat ve E-İslah bilgilerini güncelleyiniz.

*Daha Geniş Bilgi İçin
İl ve İlçe Müdürlüklerine Başvurunuz*

 **0 258 212 54 80** (4 Hat)

 **0 258 212 54 87**

 <https://denizli.tarimorman.gov.tr/>

 denizli@tarimorman.gov.tr

*Daha bol et,süt ve sağlıklı nesiller için
suni tohumlama yaptırınız...*



DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

SUNİ TOHURLAMA



SUNİ TOHURLAMA NEDİR ?

Uygun tohumlama zamanında olduğu belirlenen dişi hayvanların genital kanallarına tohumun (spermaların) hijyenik koşullarda özel aletlerle nakledilmesi işlemidir.




NEDEN SUNİ TOHURLAMA ?

- Daha Yüksek Et ve Süt verimine sahip hayvanlar elde etmek,
- Daha Sağlıklı ve güvenilir hayvanlara sahip olmak,
- Boğalardan ineklere geçebilecek hastalıklardan korunmak (Brucella vb.),
- İşletmedeki boğa bakım ve beslenme masraflarından kurtulmak,
- Yetiştiricinin çok pahalı olan yüksek verimli boğa satın almak zorunda kalmaması,
- Hayvanların döl kontrollerini sağlamak,
- Hayvanlarda ıslah faaliyetlerini yürütmek,
- Elimizdeki damızlıkların istenmeyen özelliklerinin düzeltilmesi amacıyla suni tohumlama yapılır.



Suni tohumlama yaptırdığınız uygulayıcılardan suni tohumlama yapıldığı anda Suni Tohumlama Belgesini almayı unutmayınız.

Suni Tohumlama Zaman Çizelgesi



SUNİ TOHURLAMADA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ

- 1- Tohumlama yapılacak hayvanın gelişmesini tamamlamış olması gerekir. Gelişmesini tamamlamamış genç düveler gebe kalırsa, gelişmesi yavaşlar güç doğum yapar. Ayrıca süt verimi de düşük olur.
- 2- Kulak küpesi olmayan hayvana suni tohumlama yapılmayacaktır.
- 3- İneklerin kızgınlık göstermemesi veya gebe kalmamasının en önemli nedenlerinden biri beslenme bozukluğudur. Tohumlamaya verilecek hayvanlardan düzenli döl verimi almak için kızgınlıktan doğuma kadar bakım ve beslenmeye özen gösterilmelidir.
- 4- İyi bir yetiştirici ineğini kızgınlık yönünden iyi takip edip, zamanında tohumlama yaptırmalıdır. Kızgınlık (boğasama) ineklerde 18-21 gün arayla olur.
- 5- Yetiştirici ineğine tohumlama yaptırmadan önce Veteriner Hekime ineğin ne zaman kızgınlık (Boğasaklık) gösterdiğini, kaçınıcı defa tohumlama yapılacağı konusunda doğru bilgi vermelidir.
- 6- Suni tohumlama uygulamasında ilk tohumlama yaşı en az 13 ay (390 gün) olacaktır.
- 7- En iyi tohumlama zamanı kızgınlık belirtilerinin başlamasından sonraki 10-12. saattir. Kızgınlık süresi ortalama 18. saattir. Yani en uygun tohumlama zamanı kızgınlığın ortasında ve saydam akıntının (çara) görüldüğü zamandır.
- 8- İneğinizden şüpheli akıntı, düzensiz akıntı ve genital organlarından aşırı koku gelmesi durumunda tohumlama yaptırmayınız. Bu gibi durumlarda ineğinizi mutlaka Veteriner Hekime muayene ettiriniz.
- 9- Buzağılamadan sonraki 25 inci günden önce suni tohumlama yapılmayacak ve e-ıslah sistemine tohumlama kaydı girilmeyecektir.
- 10- Düvenin ilkine buzağılama yaşında hedef 24-26 ay olmalıdır.
- 11- İneğin buzağılamasından sonra yeniden döl tutuncaya kadar geçen sürenin 85-115 gün olması hedeflenmelidir.
- 12- Birbirini izleyen iki doğum arasındaki sürenin 358-396 gün aralığında olması hedeflenmelidir.
- 13- Gebelik başına tohumlama sayısının 2 den aşağı çekilmesi hedeflenmelidir.